

## ଘାତରାଶି ଓ ଲଗାରିଦମ୍ (EXPONENTIAL NUMBERS & LOGARITHM)

### 3.1. ଘାତ ରାଶି (Exponential Numbers) :

ଘାତ ରାଶି ଏବଂ ତତ୍ତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଞ୍ଚଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ‘ $a$ ’ ଗୋଟିଏ ପରିମେଯ ସଂଖ୍ୟା ଓ ‘ $n$ ’ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ  $n$  ସଂଖ୍ୟକ  $a$  ର ଗୁଣପଳକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ  $a^n$  କୁହାଯାଏ।  $a^n$  ଗୋଟିଏ ଘାତ ରାଶି (Exponential number) ଓ ଏହାକୁ  $a$  ର  $n$  ତମ ଘାତ ( $n$ -th power of  $a$ ) କୁହାଯାଏ।  $a$  ଏହାର ଆଧାର (base) ଓ  $n$  ଘାତକ (Index ବା Exponent) ଅଟେ।

ଫରାସୀ ଗଣିତ୍ସ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ରେନେ ଡେକାର୍ଟେ (Rene Descartes) (1596-1650) ଘାତରାଶିର ସାଙ୍କେତିକ ବୂପ  $x^n$  ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଘାତକ ବୂପେ ନେଇ ଘାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗମ୍ବନ ହୋଇଥିଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ପରିମେଯ ସଂଖ୍ୟା ଓ ବାନ୍ଧବ ସଂଖ୍ୟା ଘାତକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ରାଶିର ଆଲୋଚନାରୁ ଘାତତତ୍ତ୍ଵର ବିଜ୍ଞାନ ହେଲା। ଘାତତତ୍ତ୍ଵର ପ୍ରସାରରେ ଇଂରେଜ ଗଣିତ୍ସ ଜନ ଓ ଅଲିସ୍ (John Wallis) (1616-1703) ଓ ଆଇକାକ୍ ନିଉଟନ୍ (Isaac Newton) (1642-1727)ଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍‌ଲେଖିଯୋଗ୍ୟ।

ଆମର ଦୈନିକିନ ହିସାବପତ୍ର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗଣନା ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଆଦିରେ ଘାତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବହୁକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଉଦ୍ବାଧରଣ ସ୍ଵରୂପ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଘନପଳକ ହିସାବରେ ଆମେ ଯଥାକ୍ରମେ ଦିତାୟ ଓ ଦୃତାୟ ଘାତର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉଁ। ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $a$  ହେଲେ - ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $a^2$ , ସମଘନର ଘନପଳକ  $a^3$ ; ବ୍ୟାସାର୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ  $r$  ହେଲେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ  $\pi r^2$ , ଗୋଲକର ଘନପଳକ  $\frac{4}{3} \pi r^3$  ହୁଏ। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟର ବସ୍ତୁତାକୁ ଘାତ ଜରିଆରେ  $1.983 \times 10^{30}$  ଗ୍ରାମ ଲେଖାଯାଇଥାଏ।

ଘାତକ  $n$  ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଘାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଣଗଣିତ (arithmetic)ର ଗୁଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତର୍ଗତ, ମାତ୍ର ଘାତକ ସେତେବେଳେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ପରିସର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରିମେଯ ସଂଖ୍ୟା ବା ବାନ୍ଧବ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ, ଘାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଗଣନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିତ ନ ରହି ସ୍ଵତତ୍ତ୍ବ ପରିଚୟ ଲାଭ କରେ। ଘାତରାଶିର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଘାତକ ନିୟମ (Laws of indices)କୁ ଅନୁର୍ଧ୍ଵ ରକ୍ଷଣ ସ୍ଵତତ୍ତ୍ବ ସଂଝା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ।

### 3.2. ગણન સંખ્યા-ગાતાક બિશ્વિક ઘાતરાશિ :

પૂર્બ શ્રેણીને ભૂમે જાણિ યે એક સંખ્યા બાળદાર ગુણાયારથુલે, તાહાકું સંક્ષેપરે લેખના પારું ગાતાક બયબહાર કરાયારથાએ।

યથા -  $2 \times 2 \times 2 = 2^3$ , એઠારે 2 કું આધાર એવં 3 કું ગાતાક કુહાયાએ।

$$\text{ઘેરીપરિ } \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^4, (-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = (-3)^4;$$

$$\sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^4 \text{ એવં } 3.14 \times 3.14 \times 3.14 \times 3.14 = (3.14)^4$$

ઉપરોક્ત ઉદાહરણગુઢિકરે આમે આધારકું બાળદાર સંખ્યા (અર્થાત् ગણન સંખ્યા, રજી સંખ્યા, અપરિમેય સંખ્યા પ્રભૂતી) નેચેછે। કિન્તુ ઘાતાકકું ગણન સંખ્યા નિઆયારાશી। અર્થાત्  $x$  એક બાળદાર સંખ્યા એવં  $n$  એક ગણન સંખ્યા પારું  $x \cdot x \cdot x \cdot x \dots \dots x$  ( $n$  સંખ્યાક  $x$ નું ગુણફલ) =  $x^n$

ગાતાક ગણન સંખ્યા હેલે નિમ્નલિખિત ઘાતાક નિયમગુઢિક એતયે।

### નિયમ : ઉપરાદ્ય - 1 :

$$(i) \quad x^m \times x^n = x^{m+n} \quad (ii) \quad (x^m)^n = x^{mn} \quad (iii) \quad (xy)^n = x^n \cdot y^n$$

$$(iv) \quad x^m \div x^n = x^{m-n} \quad (\text{એઠારે } m > n) \quad (v) \quad \left(\frac{x}{y}\right)^m = \frac{x^m}{y^m} \quad (y \neq 0)$$

**ત્રિજ્ઞાન :** ગોટિએ નિર્દ્દિષ્ટ આધાર પારું ગાતાક બદલિલે ઘાતરાશિની મૂલ્યટી બદલિયાએ। કિન્તુ આધાર 0 કિમા 1 સ્થાનને ભિન્ન ઘાતાક પારું મૂલ્યને પરિબર્દન હૂએ નાહીં। યથા :-

$$0^2 = 0^3 = 0^5 = \dots \dots = 0; 1 = 1^2 = 1^3 = \dots \dots = 1$$

તેણું, આધાર 0 ઓ 1 પારું ગાતાક નિયમગુઢિક પ્રયુક્ત્ય હેલે મથુર એ સ્થાનને એહા તાપ્યાંબિહાન।

### 3.3. પૂર્ણસંખ્યા ઘાતાક બિશ્વિક ઘાતરાશિ :

પૂર્ણસંખ્યા ઘેર ઝડપ કહિલે ભૂમે જાણ યે,  $Z = \{\dots\dots\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\dots\}$

એથરુ આમે 1, 2, 3..... અદી ગણન સંખ્યામાનકું ઘાતાક રૂપે બયબહાર કરી ઘાતરાશિ બિશ્વય આલોચના કરી પારિછે। તેણું આધાર બાળદાર સંખ્યા ઓ ઘાતાક શૂન બા રણામૂક પૂર્ણસંખ્યા હેલે ઘાતરાશિની અર્થ ક'ણ હેબ તાહા હી બર્દમાન આમાર આલોચનાર બિશ્વય।

આગરું સૂચના દિઓયારાશી યે ઘાતાક  $n$ , શૂન બા રણામૂક પૂર્ણસંખ્યા હેલે ઘાતરાશિ સ્તરે પરિચય દરકાર કરે; કારણ (ઉદાહરણ સરૂપ) પૂર્બરૂપની આમે  $2^0$  બા  $2^{-3}$  કું યથાક્રમે 0 સંખ્યાક બા -3 સંખ્યાક 2નું ગુણફલ બોલી કહિપારિબા નાહીં। એપરિ કહિબાર કિછી અર્થ નાહીં।

ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣ କରାଗଲା –

ସଂଜ୍ଞା : a ଏକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ବାନ୍ଧବସଂଖ୍ୟା ଏବଂ n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$  ଏବଂ  $n \in \mathbb{N}$

$$\text{ହେଲେ, } (i) a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (ii) a^0 = 1$$

[କହିବା ବାହୁଳ୍ୟ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ଦୂମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବା ଘାତାଙ୍କ ନିୟମକୁ ଅଷ୍ଟିଷ୍ଠ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦାରା ଅନୁପ୍ରେତି]

ମନେରଖ : ୦<sup>୦</sup>ର କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଏହା ଅର୍ଥହାନ ।

ଚୀକା : ସଂଜ୍ଞାନୁୟାୟୀ  $n \in \mathbb{N}$  ପାଇଁ  $a^n \times a^{-n} = a^n \times \frac{1}{a^n} = 1 \quad (\because a \neq 0)$

$$\text{ତେଣୁ ଆମେ } a^n = \frac{1}{a^{-n}}; a \neq 0, n \in \mathbb{N} - \text{ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା ।$$

ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞା ସାହାୟ୍ୟରେ ଆମେ ଯେ କୌଣସି ଅଣଶୂନ୍ୟ ଆଧାର ଓ ଶୂନ୍ୟ ବା ରଣାମୂଳକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତଗାଣିକ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା । ଯଥା –

$$2^0 = 1, 3^{-1} = \frac{1}{3}, 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}, \left(\frac{3}{7}\right)^{-1} = \frac{1}{\frac{3}{7}} = \frac{7}{3}, 10^{-3} = \frac{1}{10^3} = \frac{1}{1000} = 0.001,$$

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (ସେଟ୍ Z ର ଉପାଦାନ) ଘାତାଙ୍କ ଥୁଲେ ଘାତାଙ୍କ ନିୟମ ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ରଣାମୂଳକ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତଗାଣିକ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଏ ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଧାରକୁ ଅଣଶୂନ୍ୟ ନିଆଗଲା ।

ଉପାଦ୍ୟ - 2 :

ଯଦି a ଓ b ଉଭୟେ ଅଣଶୂନ୍ୟ ବାନ୍ଧବ ସଂଖ୍ୟା ଓ m, n ଉଭୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ତେବେ,

$$(i) a^m \times a^n = a^{m+n} \quad (ii) (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(iii) (a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n \quad (iv) a^m \div a^n = a^{m-n} \quad (v) \left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m$$

ଏ ସମସ୍ତର ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ । ମାତ୍ର ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିକର ଯଥା- (i) ର ପ୍ରମାଣ କରିବା । କାରଣ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କିପରି ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।

(i) (a) ମନେକର  $m = 0$  ଓ  $n$  ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ।

$$\therefore a^m \times a^n = a^0 \times a^n = 1 \times a^n = a^n = a^{0+n} = a^{m+n} \quad (\text{ପ୍ରମାଣିତ})$$

ସେହିପରି  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $n = 0$  ହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଯ୍ୟରେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବ ଯେ  $a^m \times a^n = a^{m+n}$

(b) ମନେକର  $m > 0$ ,  $n > 0$  ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $m, n \in \mathbb{N}$  ହେଉଥିବାରୁ ଗଣନସଂଖ୍ୟା ଘାତାଙ୍କ ନିୟମାନୁୟାୟୀ  $a^m \times a^n = a^{m+n}$

(c) ମନେକର  $m < 0$ ,  $n < 0$  |  $m, n \in \mathbb{Z}$  ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା

$$m = -p, n = -q; p, q \in \mathbb{N}$$

$$\therefore a^m \times a^n = a^{-p} \times a^{-q} = \frac{1}{a^p} \times \frac{1}{a^q} = \frac{1}{a^{p+q}} = \frac{1}{a^{-(m+n)}} = a^{m+n} \quad (\text{ପ୍ରମାଣିତ})$$

(d) ମନେକର  $m > 0, n < 0$

$n \in Z, n < 0$  ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା  $n = -p, p \in N$

(i) ଯଦି  $m > p$  ହୁଏ ତେବେ

$$a^m \times a^n = a^m \times a^{-p} = a^m \times \frac{1}{a^p} \text{ (ସଂଖ୍ୟା)} = \frac{a^m}{a^p} = a^{m-p} = a^{m+n}$$

(ii) ଯଦି  $m < p$  ହୁଏ ତେବେ  $a^m \times a^n = a^m \times a^{-p}$

$$= \frac{a^m}{a^p} = \frac{a^m}{a^{m+p-m}} = \frac{a^m}{a^m \times a^{p-m}} = \frac{1}{a^{p-m}} = a^{m-p} = a^{m+n}$$

(iii)  $m = p$  ହେଲେ  $n = -p = -m$ , ଅର୍ଥାତ୍  $m + n = 0$

$$\therefore a^m \times a^n = a^m \times a^{-m} = a^m \times \frac{1}{a^m} = 1 = a^0 \text{ (ସଂଖ୍ୟା)} = a^{m+n}$$

ତେଣୁ  $m > 0, n < 0$  ହେଲେ  $a^m \times a^n = a^{m+n}$  (ପ୍ରମାଣିତ)

ଉପରୋକ୍ତ ଜାଞ୍ଚାରେ  $m < 0$  ଓ  $n > 0$  ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ଯେ  $a^m \times a^n = a^{m+n}$

ତେଣୁ ସମୟ ପରିଷ୍ଠିତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ a ଏକ ଅଣ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧବ ସଂଖ୍ୟା ଓ m, n ଉଚ୍ଚତାରେ

ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହେଲେ  $a^m \times a^n = a^{m+n}$ ।

ଉଦାହରଣ - 1 :

$$(i) 4\text{ଟି } \frac{1}{9} \text{ ର ଗୁଣଫଳ} = 9^{-4} \quad (ii) 3\text{ଟି } a \text{ ର ଗୁଣଫଳକୁ } \frac{1}{a} \text{ ର ଘାତରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର।}$$

ସମାଧାନ :

$$(i) 4\text{ଟି } \frac{1}{9} \text{ ର ଗୁଣଫଳ} = \frac{1}{9} \times \frac{1}{9} \times \frac{1}{9} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{9^4} = 9^{-4} \quad (\text{ଉଚ୍ଚତା})$$

$$(ii) 3\text{ଟି } a \text{ ର ଗୁଣଫଳ} = a \times a \times a = a^3 = a^{-1 \times -3} = (a^{-1})^{-3} = \left(\frac{1}{a}\right)^{-3} \quad (\text{ଉଚ୍ଚତା})$$

ଉଦାହରଣ - 2 :

ରଣାମ୍ବକ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର : (i) 0.0026, (ii) 0.000105

ସମାଧାନ :

$$(i) 0.0026 = \frac{26}{10000} = \frac{26}{10^4} = 26 \times 10^{-4} \quad (\text{ଉଚ୍ଚତା})$$

$$(ii) 0.000105 = \frac{105}{1000000} = \frac{105}{10^6} = 105 \times 10^{-6} \quad (\text{ଉଚ୍ଚତା})$$

ଉଦାହରଣ - 3 :

ଏକ ଆଧାର ଓ ଏକ ଘାତାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର :

$$(i) 7^5 \times 7^9 \quad (ii) (4^5)^3 \quad (iii) 3^5 \times 4^5$$

$$(iv) \quad \frac{2^5}{4^3}$$

$$(v) \quad p \times p^3 \times p^5$$

$$(vi) \quad \left(-\frac{a}{b}\right)^5 \times \left(-\frac{a}{b}\right)^7; (b \neq 0)$$

ସମାଧାନ :

$$(i) \quad 7^5 \times 7^9 = 7^{5+9} = 7^{14}$$

$$(ii) \quad (4^5)^3 = 4^{5 \times 3} = 4^{15}$$

$$(iii) \quad 3^5 \times 4^5 = (3 \times 4)^5 = 12^5$$

$$(iv) \quad \frac{2^5}{4^3} = \frac{2^5}{(2^2)^3} = \frac{2^5}{2^6} = 2^{5-6} = 2^{-1}$$

$$(v) \quad p \times p^3 \times p^5 = p^{1+3+5} = p^9$$

$$(vi) \quad \left(-\frac{a}{b}\right)^5 \times \left(-\frac{a}{b}\right)^7 = \left\{(-1) \times \frac{a}{b}\right\}^5 \times \left\{(-1) \times \frac{a}{b}\right\}^7 = (-1)^5 \times \left(\frac{a}{b}\right)^5 \times (-1)^7 \times \left(\frac{a}{b}\right)^7 \\ = (-1)^{5+7} \times \left(\frac{a}{b}\right)^{5+7} = (-1)^{12} \times \left(\frac{a}{b}\right)^{12} = \left(\frac{a}{b}\right)^{12} \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଉଦାହରଣ - 4 :

ଶୈଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିମାନଙ୍କର ଗୁଣପଦ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର :

$$(i) \quad 12^5$$

$$(ii) \quad 686^{-3}$$

$$(iii) \quad \frac{121 \times 12^3}{70^2}$$

ସମାଧାନ :

$$(i) \quad 12^5 = (2^2 \times 3)^5 = (2^2)^5 \times 3^5 = 2^{10} \times 3^5 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

$$(ii) \quad 686^{-3} = (2 \times 7^3)^{-3} = 2^{-3} \times (7^3)^{-3} = 2^{-3} \times 7^{-9} \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

$$(iii) \quad \frac{121 \times 12^3}{70^2} = \frac{11^2 \times (2^2 \times 3)^3}{(2 \times 5 \times 7)^2} = 11^2 \times (2^2 \times 3)^3 \times (2 \times 5 \times 7)^{-2}$$

$$= 11^2 \times 2^6 \times 3^3 \times 2^{-2} \times 5^{-2} \times 7^{-2} = 2^{6-2} \times 3^3 \times 5^{-2} \times 7^{-2} \times 11^2$$

$$= 2^4 \times 3^3 \times 5^{-2} \times 7^{-2} \times 11^2 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଉଦାହରଣ - 5 : ସରଳ କର :

$$(i) \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{-3} \times \left(\frac{5}{3}\right)^{-2} \div \left(\frac{8}{5}\right)^{-1} \quad (ii) \quad a^3 \div a^5 \times a^4 \quad (a \neq 0) \quad (ii) \quad 2^{2^3} \div (2^2)^3$$

ସମାଧାନ :

$$(i) \quad \text{ଦର ରାଶି} = \frac{1}{\left(\frac{2}{5}\right)^3} \times \frac{1}{\left(\frac{5}{3}\right)^2} \div \frac{1}{\frac{8}{5}} = \frac{1}{2^3} \times \frac{1}{5^2} \div \frac{1}{\frac{8}{5}}$$

$$= \frac{125}{8} \times \frac{9}{25} \div \frac{5}{8} = \frac{125}{8} \times \frac{9}{25} \times \frac{8}{5} = 9 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

[ 40 ]

$$(ii) \quad a^3 \div a^5 \times a^4 = a^{3-5} \times a^4 = a^{-2} \times a^4 = a^{-2+4} = a^2 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

$$(iii) \quad 2^{2^3} \div (2^2)^3 = 2^8 \div 2^{2 \times 3} = 2^{8-6} = 2^2 = 4 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଉଦାହରଣ - 6 : ସରଳ କର :  $\frac{2^{m+1} \cdot 3^{2m-1} \cdot 5^{m+n} \cdot 6^n}{15^m \cdot 10^{n+2} \cdot 6^m \cdot 3^{n-1}}$ ;  $m, n \in \mathbb{Z}$

ସମାଧାନ : ଦର ରାଶି =  $\frac{2^{m+1} \cdot 3^{2m-1} \cdot 5^{m+n} \cdot (2 \times 3)^n}{(3 \times 5)^m \cdot (2 \times 5)^{n+2} \cdot (2 \times 3)^m \cdot 3^{n-1}} = \frac{2^{m+1} \cdot 3^{2m-1} \cdot 5^{m+n} \cdot 2^n \cdot 3^n}{3^m \cdot 5^m \cdot 2^{n+2} \cdot 5^{n+2} \cdot 2^m \cdot 3^m \cdot 3^{n-1}}$   
 $= \frac{2^{m+n+1} \cdot 3^{2m+n-1} \cdot 5^{m+n}}{2^{m+n+2} \cdot 3^{2m+n-1} \cdot 5^{m+n+2}} = 2^{(m+n+1)-(m+n+2)} \times 3^0 \times 5^{(m+n)-(m+n+2)}$   
 $= 2^{-1} \times 1 \times 5^{-2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5^2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{25} = \frac{1}{50} \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$

ଉଦାହରଣ - 7 : ସରଳ କର :  $\left(\frac{a^1}{a^m}\right)^{l^2+lm+m^2} \times \left(\frac{a^m}{a^n}\right)^{m^2+mn+n^2} \times \left(\frac{a^n}{a^l}\right)^{n^2+nl+l^2}$

$$[a \in \mathbb{R}, a \neq 0; l, m, n \in \mathbb{Z}]$$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} \text{ଦରରାଶି} &= (a^{1-m})^{l^2+lm+m^2} \times (a^{m-n})^{m^2+mn+n^2} \times (a^{n-l})^{n^2+nl+l^2} \\ &= a^{(1-m)(l^2+lm+m^2)} \times a^{(m-n)(m^2+mn+n^2)} \times a^{(n-l)(n^2+nl+l^2)} \\ &= a^{l^3-m^3} \times a^{m^3-n^3} \times a^{n^3-l^3} = a^{l^3-m^3+m^3-n^3+n^3-l^3} = a^0 = 1 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର}) \end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ - 8 :  $2^6 \times 9^3 \times 216 = 6^a$  ହେଲେ a ର ମାନ କେତେ ?

ସମାଧାନ :

$$2^6 \times 9^3 \times 216 = 2^6 \times (3^2)^3 \times 6^3 = 2^6 \times 3^6 \times 6^3$$

$$= (2 \times 3)^6 \times 6^3 = 6^6 \times 6^3 = 6^9$$

$$\therefore \text{ପ୍ରଶ୍ନାନ୍ୟାୟ } 6^9 = 6^a \Rightarrow a = 9 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଦୁଷ୍ଟବ୍ୟ :  $a > 0, a \neq 1$  ଏବଂ  $m, n \in \mathbb{Z}$  ହେଲେ  $a^m = a^n \Rightarrow m = n$

### ଅନୁଶୀଳନୀ - 3(a)

1. ଗୁଣଫଳକୁ ଘାତରାଶି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କର।

$$(i) \quad \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{2}, (ii) \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(-\frac{3}{5}\right), (iii) 0.01 \times 0.01 \times 0.01 \times 0.01$$

$$(iv) \quad 0.5 \times 0.5 \times \dots \times 0.5 \text{ (100 ଥର)}, (v) \quad \frac{1}{3.7} \times \frac{1}{3.7} \times \dots \times \frac{1}{3.7} \text{ (m ଥର)}$$

2. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଉଚ୍ଚ ଚିହ୍ନାଥା ।

(i)  $2^3 \times 2^7 = 2^{10}$ , (ii)  $2^3 \times 3^7 = 5^{10}$ , (iii)  $2^3 \times 3^2 = 6^5$ , (iv)  $(3^3)^2 = 3^5$

(v)  $(7^m)^2 = 7^{2m}$ , (vi)  $3^5 \times 4^3 = 12^5$ , (vii)  $3^7 \times 3^{-7} = 1$ , (viii)  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1} = \frac{3}{2}$

(ix)  $(-2)^5 \times (-2)^{-3} = (-2)^8$ , (x)  $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4} \times \left(\frac{1}{5}\right)^{-4} = \left(\frac{1}{15}\right)^{-4}$ , (xi)  $\left(\frac{1}{7}\right)^{-3} = \frac{1}{343}$

(xii)  $10^a \times 10^2 = 10^{2a}$ , (xiii)  $10^{2n} = 10^{2^n}$ , (xiv)  $(a^2)^3 = a^{2^3}$ , (xv)  $\left(\frac{a}{b}\right)^{-1} \times \frac{a}{b} = 1$

3. କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ।

(i)  $3^5 \times 3^3 = 3^{\square}$  (ii)  $(6^2)^{\square} = 6^{-8}$  (iii)  $8^{-3} \times 8^{-2} = 8^{\square}$

(iv)  $2^{-3} \times 3^{-3} = 6^{\square}$  (v)  $\frac{x^2}{x^5} = x^{\square}, x \neq 0$  (vi)  $\left(\frac{3}{5}\right)^{\square} = \frac{27}{\square}$

4. ରଣାମୁକ ଘାତାଙ୍କ ଅପସାରଣ କର ।

(i)  $6^{-4}$ , (ii)  $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$ , (iii)  $\frac{1}{8^{-3}}$ , (iv)  $\frac{1}{x^{-10}}, x \neq 0$ , (v)  $2c^{-m}, (c \neq 0, m > 0)$

5. (a) ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଭର ବାକି ଶୂନ୍ୟପ୍ଲାନ ପୂରଣ କର ।

$3^{-4} = \underline{\hspace{2cm}}$

[ $-(3)$ ର ଚର୍ଚା ଘାତ),  $(-3)$ ର ଚର୍ଚା ଘାତ,  $-4$  ସଂଖ୍ୟକ  $3$ ର ଗୁଣଫଳ,  $4$ ଟି  $\pi$   $\frac{1}{3}$  ଗୁଣଫଳ]

(b) ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମୀକରଣ ଓ କେଉଁଟି ଅଭେଦ ତାହା ଦର୍ଶାଅ ।

$[(xy)^2 = x^2y^2, (x+y)^2 = x^2 + y^2, (x-y)^2 = x^2 - y^2, (x+y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy]$

6.  $\left(-\frac{2}{3}\right)^a = \frac{16}{81}$  ହେଲେ  $a$ ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

7.  $a^x$  ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କର । (ଆବଶ୍ୟକ ମୁଲଚିହ୍ନ ଅପସାରଣ କର)

(i)  $3^{-2} \times 4^{-2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$  (ii)  $3^5 \times 4^5$  (iii)  $(\sqrt{3})^6 \times (\sqrt{3})^{-12}$

(iv)  $(4^{-4})^4 \times \left\{ \left(\frac{4}{3}\right)^{-3} \right\}^{-4}$  (v)  $8^{-3} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{-3} \times (0.25)^{-3}$

(vi)  $\left(\frac{3}{4}\right)^5 \times \left(\frac{3}{4}\right)^{-m} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{3m}$  (vii)  $\frac{a}{b} \times \left(\frac{a}{b}\right)^3 \times \left(-\frac{a}{b}\right)^{-2}$  ( $a \neq 0, b \neq 0$ )

(viii)  $\left(\frac{2}{3}\right)^8 \times \frac{32}{243} \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{9}$ , (ix)  $\left(\frac{3}{2}\right)^9 \times \left(-\frac{2}{5}\right)^9$ , (x)  $8^{-3} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{-3} \times (0.125)^{-3}$

8. ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

- (i)  $2^{-2} \times 5^{-2}$ , (ii)  $\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}$ , (iii)  $\frac{1}{2^{-4} \times 3^{-2} \times 5^{-1}}$ , (iv)  $\left(\frac{p}{q}\right)^{-1}$  ଯଦି  $p = 2$  ଓ  $q = -3$ .  
(v)  $(0.25)^3 \times 4^3$ , (vi)  $(0.125)^{-7} \times 8^{-7}$ , (vii)  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-3} \times \left(\frac{3}{2}\right)^{-2}$

9. ସରଳ କର :

- (i)  $8^{-3} \div 16^{-2}$  (ii)  $\left(\frac{2}{3}\right)^{-7} + \left(\frac{4}{9}\right)^{-3}$  (iii)  $27^{-5} \times 9^{-3} \div 81^{-5}$   
(iv)  $\frac{12^{-4} \times 18^{-2}}{24^{-6}}$  (v)  $\left(\frac{4}{5}\right)^{-2} \times 5^{-2} \div 2^{-5}$  (vi)  $\frac{2^{-4}}{3^{-2}} + \frac{4^{-2}}{9^{-1}} \times \frac{1}{10^{-2}}$   
(vii)  $\frac{4^{3-m} \times 8^{2m-1}}{16^{m+2}}$ ,  $m \in Z$  (viii)  $\frac{2^{m+1} \times 3^{3m-2} \times 12^m}{9^{2m} \times 8^m}$ ,  $m \in Z$

10. (i) କେଉଁ ଆଧାରର ଦୃଢ଼ୀୟ ଘାତ  $\frac{1}{0.216}$  ହେବ ?

- (ii)  $2^{-3}$  ଓ  $(-3)^2$  ମଧ୍ୟରେ  
(a) କାହାର ଆଧାର ବଡ଼ ? (b) କାହାର ଘାତାଙ୍କ ବଡ଼ ? (c) କେଉଁ ରାଶିଟି ବଡ଼ ?  
(iii) ଦୁଇଟି ରାଶିର ଗୁଣପଦ 4<sup>7</sup>; ଗୋଟିଏ ରାଶି 4<sup>-3</sup> ହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଶିଟିକୁ 2 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର।  
(iv)  $10^{-3}$ କୁ କେଉଁ ଘାତରାଶିଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ଭାଗପଦ 2<sup>-3</sup> ହେବ ?  
(v) କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ  $y$  ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ?  
(a)  $16^3 \times 8^2 = 16^y$  (b)  $16^3 \times 8^2 = {}^0 8^y$

11. ସରଳ କର।

- (i)  $\frac{4^{3n-1} \times 9^{3n+2} \times 125^{2n}}{8^{2n} \times 27^{2n-1} \times 25^{3n}}$ ,  $n \in Z$  (ii)  $\frac{10^{3m-1} \times 25^{m+2} \times 8^{m-1}}{20^{2m-1} \times 4^m \times 125^{m-1}}$ ,  $m \in Z$   
(iii)  $(a^1)^{m-n} \times (a^m)^{n-1} \times (a^n)^{1-m}$  [  $a \in R$ ,  $a \neq 0, 1$ ,  $m, n \in Z$  ]  
(iv)  $\left(\frac{a^p}{a^q}\right)^{p+q} \times \left(\frac{a^q}{a^r}\right)^{q+r} \times \left(\frac{a^r}{a^p}\right)^{r+p}$  [  $a \in R$ ,  $a \neq 0$ ,  $p, q, r \in Z$  ]

12.  $x \in R$ ,  $x \neq 0$ ,  $a, b, c \in Z$  ହେଲେ ଗୁଣାଣ କର ଯେ,

- (i)  $\frac{1}{1+x^{b-a}+x^{c-a}} + \frac{1}{1+x^{c-b}+x^{a-b}} + \frac{1}{1+x^{a-c}+x^{b-c}} = 1$   
(ii)  $\frac{1}{1+x^{a-b}+x^{a-c}} + \frac{1}{1+x^{b-c}+x^{b-a}} + \frac{1}{1+x^{c-a}+x^{c-b}} = 1$  (iii)  $\left(\frac{x^b}{x^c}\right)^a \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^b \times \left(\frac{x^a}{x^b}\right)^c = 1$

- 13.(i) যদি  $a = xy^{p-1}$ ,  $b = xy^{q-1}$ ,  $c = xy^{r-1}$  হুও [  $x, y \in R$ ,  $x \neq 0, y \neq 0$  ও  $p, q, r \in Z$  ]  
তেবে প্রমাণ কর যে  $a^{q-r} \times b^{r-p} \times c^{p-q} = 1$
- (ii) যদি  $a = x^p y^{q+r}$ ,  $b = x^q y^{r+p}$ ,  $c = x^r y^{p+q}$  হুও তেবে প্রমাণ কর যে  $a^{q-r} \cdot b^{r-p} \cdot c^{p-q} = 1$ .  
[ $x, y \in R$ ,  $x \neq 0, y \neq 0$  ও  $p, q, r \in Z$ ]

14.  $[x \in R, x \neq 0$  ও  $m, n, p \in Z]$  হেলে নিম্ন উকিগুড়িকর মান নির্ণয় কর :

$$(i) \left( \frac{x^{p^2+m^2}}{x^{-pm}} \right)^{p-m} \times \left( \frac{x^{m^2+n^2}}{x^{-mn}} \right)^{m-n} \times \left( \frac{x^{n^2+p^2}}{x^{-np}} \right)^{n-p}$$

$$(ii) \left( \frac{x^{p^2+m^2}}{x^{pm}} \right)^{p+m} \times \left( \frac{x^{m^2+n^2}}{x^{mn}} \right)^{m+n} \times \left( \frac{x^{n^2+p^2}}{x^{np}} \right)^{n+p}$$

15.  $9 \times 5^2 \times 225 = 15^x$  হেলে  $x$ র মান কেতে ?

#### 3.4. পরিমেয় সংখ্যা ঘাতাঙ্ক বিশিষ্ট ঘাতগার্হি :

এ বিষয়ের কিছি আলোচনা করিবা পূর্বে বাস্তব সংখ্যা পের  $R$  র গোটিএ ধর্ম সংপর্কের জাণিবা আবশ্যিক। তাহা হেলো -  $a$  গোটিএ ধনামূক বাস্তব সংখ্যা ও  $n$  এক গণন সংখ্যা হেলে  $a$  ও  $n$  র নির্দিষ্ট মান পাই গোটিএ মাত্র বাস্তব সংখ্যা  $x > 0$  রহিব, যেপরিকি  $x^n = a$  হেব।

উপরোক্ত উক্ত সংপর্কের উক্ততর গণিতের বিশেষ আলোচনা করায়াছি। আবশ্যিকতা দৃষ্টিকৃত একটি অসম্ভব মাত্র করাগুলি। বাস্তব সংখ্যা পেরে উপরোক্ত ধর্ম, পরিমেয় সংখ্যা পেরে দেখায়া নাহি। এহা বুমে  $x^2 = 2$  সমাকরণের বুদ্ধি পারিব। এহি সমাকরণের সমাধান পরিমেয় সংখ্যা পেরে নাহি - একথা আগতু জাণিছ।

$x^n = a$  হেলে আমে  $x$  কু  $a$  র গোটিএ  $n$  তম মূল ( $n$ -th root) বোলি কহু। বাস্তব সংখ্যা পেরে উল্লিখিত ধর্ম দৃষ্টিকৃত যে কৌণ্ডি ধনামূক সংখ্যা  $a$ র এক  $n$  তম মূল রূপে ( $n \in N$ ) আমে নির্ণয় গোটিএ মাত্র ধনামূক বাস্তব সংখ্যা পাইপারিবা ও  $a$  র এহি ধনামূক  $n$ -তম মূলকু  $\sqrt[n]{a}$  সংজ্ঞেত দ্বারা প্রকাশ করিবা। উদাহরণ ধৰুপ  $2^2 = 4$  ও  $(-2)^2 = 4$  হেଉথবাৰু 4-ৰ দুজটি বৰ্গমূল 2 ও -2 অংকিত। মাত্র কেবল ধনামূক বৰ্গমূল 2কু হী  $\sqrt{4}$  বোলি লেখায়া ও গণামূক বৰ্গমূল -2 কু  $-\sqrt{4}$  বোলি লেখায়া।

ঘাতাঙ্ক পরিমেয় সংখ্যা নেই আমে বৰ্তমান ঘাতগার্হির অর্থ নিরূপণ করিবা।  $n$  গোটিএ পরিমেয় সংখ্যা হেলে আমে লেখাপারিবা -

$n = \frac{p}{q}$  যেଉৱারে  $p$  এক পূর্ণসংখ্যা ও  $q$  এক গণন সংখ্যা।

ସଂଜ୍ଞା : a ଏକ ଧନୀମୂଳ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଓ p ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଓ q ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍  
 $a \in \mathbb{R}^+, p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}$  ହେଲେ  $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$ .

ଟେକା : (i) ଉପରୋକ୍ତ ସଂଜ୍ଞାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତରୂପେ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରିବ -  $a^{\frac{p}{q}} = (\sqrt[q]{a})^p$

[ ପୂର୍ଯ୍ୟଯକ୍ଷମେ p = 0, p > 0 ଓ p < 0 ନେଇ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ  $(\sqrt[q]{a})^p = \sqrt[q]{a^p}$  ]

(ii)  $a > 0$  ଓ n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ  $a^{\frac{1}{n}}$  ର ଅର୍ଥ ସଂଜ୍ଞାନୁୟାୟୀ କେବଳ  $\sqrt[n]{a}$  ଅର୍ଥାତ୍ a ର  
 ଧନୀମୂଳ n-ତମ ମୂଳକୁ ହିଁ ବୁଝିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ  $4^{\frac{1}{2}}$  ର ଅର୍ଥ ହେଲି  $\sqrt{4}$  ଅର୍ଥାତ୍ 2;  $2^{\frac{1}{2}}$  ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ  
 ଘାତଗାଣି ମାଧ୍ୟମରେ 4ର ବର୍ଗମୂଳ ଦୂରଚିକ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ  $4^{\frac{1}{2}}$  ଓ  $-4^{\frac{1}{2}}$  ବୋଲି  
 ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବା।

ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଯୋଗ କରି ଆମେ ଧନୀମୂଳ ଆଧାର ଓ ଯେ କୌଣସି ପରିମେୟ ଘାତକ  
 ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତ ଗାଣିର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଯଥା-

$$(i) 4^{-\frac{5}{2}} = (\sqrt{4})^{-5} = 2^{-5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32} \quad (ii) 343^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{343} = \sqrt[3]{7^3} = 7$$

$$(iii) \left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{\frac{8}{27}}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

$$(iv) 1024^{1.2} = 1024^{\frac{12}{10}} = (\sqrt[10]{1024})^{12} = (\sqrt[10]{2^{10}})^{12} = 2^{12} = 4096$$

[ $1024 = 2^{10}$  ହୋଇଥିବାରୁ  $\sqrt[10]{1024}$  ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସହଜ ହେଲା। ସାଧାରଣ ତାବେ ଯେ କୌଣସି  
 ଧନୀମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର n-ତମ ମୂଳ ( $n \in \mathbb{N}$ ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚିତ ହେବ ।]

ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ : a > 0 ଓ n ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ସଂଜ୍ଞାନୁୟାୟୀ  $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$  ମାତ୍ର  $x^n = a$  ସମୀକରଣକୁ  $a = 0$   
 ଓ  $a < 0$  ପାଇଁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆମେ  $a \leq 0$  ଓ  $n \in \mathbb{N}$  ପାଇଁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ  $a^{\frac{1}{n}}$  ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ  
 ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇବ ତାହା ଜାଣିପାରିବା ।

0 (ଶୂନ୍ୟ) ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର n-ତମ ଘାତ n ର ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା-ମାନ ପାଇଁ  
 0 ଅଟେ । ( $0^n = 0$ ) ତେଣୁ  $x^n = 0$  ସମୀକରଣ କେବଳ ମାତ୍ର  $x = 0$  ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ; ଅର୍ଥାତ୍ 0ର nତମ  
 ମୂଳ ( $n \in \mathbb{N}$ ) କେବଳ 0 ଅଟେ । ସେହି କାରଣରୁ ଆମେ  $0^{\frac{1}{n}}$  ଓ  $0^{\frac{m}{n}}$  ଯେଉଁଠାରେ m ଓ n ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା  
 ପାଇଁ ନିମ୍ନମତେ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରକରଣ କରି ପାରିବା ।

ସଂଜ୍ଞା :  $0^{\frac{1}{n}} = 0$ , n ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା;  $0^{\frac{m}{n}} = 0$ , m ଓ n ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ।

$x^n = a$  ସମୀକରଣରେ  $a < 0$  ହେଲେ, nର ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମାନ ପାଇଁ x ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା  
 ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହି ପାରିବା ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ  $a = -1$  ଓ  $n = 2$  ହେଲେ  $x^2 = -1$  ସମୀକରଣରେ  
 x ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ; କାରଣ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ରଣାମୂଳ ନୁହେଁ । n ଯଦି ଏକ ଯୁଗ

ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହୁଏ ତେବେ  $x$  ର ଯେକୌଣସି ବାପ୍ରବ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ  $x^n$  ଗଣାମନ୍ତର ନୁହେଁ; ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣାମନ୍ତର  $a$  ଓ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା  $n$  ପାଇଁ  $x^n = a$  ସମୀକରଣର କୌଣସି ବାପ୍ରବ ମୂଳ ନାହିଁ । ତେଣୁ -

॥ ଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଓ  $a < 0$  ହେଲେ  $a^{\frac{1}{n}}$  କୌଣସି ବାପ୍ରବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ।

ମାତ୍ର ଯଦି  $n$  ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା (ଅର୍ଥାତ୍ 3) ଓ  $a < 0$  (ଅର୍ଥାତ୍ -8) ହୁଏ ତେବେ  $a$  ର ଏକମାତ୍ର ବାପ୍ରବ  $n$ -ତମ ମୂଳ  $\sqrt[3]{-8} = -\sqrt[3]{8} = -2$  ଅଟେ । ପୁନଃ ଉଦାହରଣ ସବୁପାଇଁ

$$(-27)^{\frac{1}{3}} = -\sqrt[3]{27} = -3, (-8)^{\frac{5}{3}} = \left\{ (-8)^{\frac{1}{3}} \right\}^5 = (-2)^5 = -32$$

ମନେରଣ୍ଜନ :  $a^{\frac{1}{n}}, n \in \mathbb{N}$  ଓ  $a \leq 0$  ପାଇଁ ମୂଲବିଶେଷରେ ସଂଖ୍ୟାବନ୍ଧ ହୋଇ ପାରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିମେଯ-  
ଘାତାକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିର ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣ ଭାବେ ଧନାମନ୍ତର ଆଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟୁକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ ।

ଉପପାଦ୍ୟ - 3 :

$a$  ଓ  $b$  ଧନାମନ୍ତର ବାପ୍ରବ ସଂଖ୍ୟା ଓ  $m, n$  ପରିମେଯ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ,

$$(i) a^m \times a^n = a^{m+n} \quad (ii) (a^m)^n = a^{mn}$$

$$(iii) (a.b)^m = a^m \cdot b^m \quad (iv) a^m \div a^n = a^{m-n}$$

ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରିବା । ମାତ୍ର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତ ଏଠାରେ ଆମେ କେବଳ (i)ର ପ୍ରମାଣ କରିବା ।

ପ୍ରମାଣ :

(i)  $m$  ଓ  $n$  ପରିମେଯ ସଂଖ୍ୟା ହେତୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା -

$$m = \frac{p}{q}, n = \frac{r}{s}; \text{ ଯେପରି } p, r \text{ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଓ } q, s \text{ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ।$$

$$\begin{aligned} (i) \quad (a^m \times a^n)^{qs} &= \left( a^{\frac{p}{q}} \times a^{\frac{r}{s}} \right)^{qs} = \left( a^{\frac{p}{q}} \right)^{sq} \times \left( a^{\frac{r}{s}} \right)^{qs} = \left[ \left( a^{\frac{p}{q}} \right)^q \right]^s \times \left[ \left( a^{\frac{r}{s}} \right)^s \right]^q \\ &= (a^p)^s \times (a^r)^q = a^{ps} \times a^{rq} = a^{ps+rq} \\ \therefore a^m \times a^n &= a^{\frac{ps+rq}{qs}} \Rightarrow a^{\frac{p+r}{q+s}} = a^{m+n} \end{aligned} \quad (\text{ପ୍ରମାଣିତ})$$

3.5. ବାପ୍ରବ ସଂଖ୍ୟା ଘାତାକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶି :

$a^x$ ରେ ଘାତାଙ୍କ  $x$  ଏକ ବାପ୍ରବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଘାତାଙ୍କ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ । ଏଠାରେ ମନେରଖିବା ଭର୍ତ୍ତା ଯେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରଚିଲା, ତେଣୁ  $a^x$ ରେ ଘାତାଙ୍କ  $x$  ବାପ୍ରବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ପୂର୍ବେ ଆଲୋଚିତ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ସାକାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ।

ଉଦାହରଣ - 9 : ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$$(i) 343^{\frac{1}{3}} \quad (ii) \left( 8^{-\frac{3}{4}} \right)^{\frac{4}{9}} \quad (iii) \left( \frac{-32}{243} \right)^{\frac{2}{5}} \quad (iv) (0.125)^{\frac{1}{3}} \quad (v) \left( 3\frac{3}{8} \right)^{-\frac{1}{3}}$$

ସାଧାରଣ :

$$(i) \quad 343^{\frac{1}{3}} = (7^3)^{\frac{1}{3}} = 7^{3 \times \frac{1}{3}}, \quad (ii) \quad \left(8^{-\frac{3}{4}}\right)^{\frac{4}{9}} = 8^{-\frac{3 \times 4}{4 \times 9}} = 8^{-\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8^{-1}} = \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}$$

$$(iii) \quad \left(\frac{32}{243}\right)^{\frac{2}{5}} = \left\{\left(\frac{2}{3}\right)^5\right\}^{\frac{2}{5}} = \left(\frac{2}{3}\right)^{5 \times \frac{2}{5}} = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}, \quad (iv) \quad (0.125)^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{0.125} = \sqrt[3]{(0.5)^3} = 0.5$$

$$(v) \quad \left(3\frac{3}{8}\right)^{-\frac{1}{3}} = \left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{\left(\frac{27}{8}\right)^{-1}} = \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3} \quad (\text{ଉଦୟ})$$

ଉଦ୍ବାହଣ - 10 :

$a, b, c \in R^+, a \neq 1, x, y, z \in R$  ଓ  $a^x = b, b^y = c, c^z = a$  ହେଲେ ପ୍ରମାଣୀ କର ଯେ,  $xyz = 1$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} c^z &= a \Rightarrow (b^y)^z = a \quad (\because c = b^y) \\ \Rightarrow b^{yz} &= a \Rightarrow (a^x)^{yz} = a \quad (\because b = a^x) \\ \Rightarrow a^{xyz} &= a^1 \Rightarrow xyz = 1 \end{aligned} \quad (\text{ପ୍ରମାଣିତ})$$

ଦ୍ରୁଷ୍ଟବ୍ୟ :  $a = 1$  ହେଲେ ଆମେ  $xyz = 1$  ବୋଲି କହି ପାରିବା ନାହିଁ । 1 ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଧନୀମୂଳକ ତଥା ଯାହାର ସମସ୍ତ ଘାତ, ଘାତକ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ । ତେଣୁ  $a^m = a^n, a > 0 \Rightarrow m = n$  କେବଳ  $a \neq 1$  ପାଇଁ ହିଁ ସତ୍ୟ ।

ଉଦ୍ବାହଣ - 11 :

$$\text{ସରଳ କର : } \sqrt{a^4 b^{-\frac{4}{3}} c^{\frac{5}{6}}} \div \sqrt[3]{a^4 b^{-6} c^{\frac{3}{4}}}$$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} \sqrt{a^4 b^{-\frac{4}{3}} c^{\frac{5}{6}}} &= \left(a^4 b^{-\frac{4}{3}} c^{\frac{5}{6}}\right)^{\frac{1}{2}} = a^{4 \times \frac{1}{2}} \cdot b^{-\frac{4}{3} \times \frac{1}{2}} \cdot c^{-\frac{5}{6} \times \frac{1}{2}} = a^2 \cdot b^{-\frac{2}{3}} \cdot c^{-\frac{5}{12}} \\ \sqrt[3]{a^4 b^{-6} c^{\frac{3}{4}}} &= \left(a^4 b^{-6} c^{\frac{3}{4}}\right)^{\frac{1}{3}} = a^{4 \times \frac{1}{3}} \cdot b^{-6 \times \frac{1}{3}} \cdot c^{\frac{3}{4} \times \frac{1}{3}} = a^{\frac{4}{3}} \cdot b^{-2} \cdot c^{\frac{1}{4}} \\ \therefore \text{ ଦରାଖି } &= \frac{a^2 \cdot b^{-\frac{2}{3}} \cdot c^{-\frac{5}{12}}}{a^{\frac{4}{3}} \cdot b^{-2} \cdot c^{\frac{1}{4}}} = a^{2-\frac{4}{3}} \cdot b^{-\frac{2}{3}+2} \cdot c^{-\frac{5}{12}-\frac{1}{4}} \\ &= a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{4}{3}} \cdot c^{-\frac{2}{3}} = \left(\frac{ab^2}{c}\right)^{\frac{2}{3}} \end{aligned} \quad (\text{ଉଦୟ})$$

ଅନୁଶୀଳନ 1 - 3(b)

1. ଠିକ୍ ଉଚର ବାହି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର :

(i)  $(0.01)^{-\frac{1}{2}} = \text{_____}$  [(A) 0.01, (B) 0.1, (C) 1.0, (D) 10]

(ii)  $\left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{1}{3}} = \text{_____}$  [(A)  $\frac{1}{3}$ , (B)  $-\frac{1}{3}$ , (C) 3, (D) -3]

(iii)  $x^{-\frac{3}{5}} \cdot 2x^{-\frac{1}{5}} = \text{_____} \quad (x \in \mathbb{R}, x > 0)$  [(A)  $\frac{1}{2^4 x^5}$ , (B)  $\frac{2}{4\sqrt[4]{x^5}}$ , (C)  $\frac{1}{2\sqrt[5]{x^4}}$ , (D)  $\frac{2}{\sqrt[5]{x^4}}$ ]

2. ରଣାମୂଳ ଓ ଭର୍ଗସଂଖ୍ୟା-ଘାତାଙ୍କ ଅପସାରଣ କର :

(i)  $a^{\frac{3}{4}}$  (ii)  $a^{-4}$  (iii)  $a^{-\frac{3}{2}}$  (iv)  $\frac{1}{a^{-5}}$  (v)  $x^{-\frac{5}{7}}$  (vi)  $\frac{1}{2x^{-5}}$

3. ମୂଲଚିହ୍ନ ଓ ରଣାମୂଳ-ଘାତାଙ୍କ ଅପସାରଣ କର : ( $a > 0, x > 0$ )

(i)  $(\sqrt[3]{a})^5$  (ii)  $(\sqrt[4]{x})^{-2}$  (iii)  $\frac{1}{2\sqrt[5]{x^{-3}}}$  (iv)  $3\sqrt[4]{a^{-8}}$  (v)  $\frac{2}{5\sqrt{x^{-3}}}$

4. ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା-ଘାତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର; ଯେପରି :  $3^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{3^2}$

(i)  $a^{\frac{1}{5}}$  (ii)  $10^{\frac{1}{3}}$  (iii)  $2a^{-\frac{1}{5}}$  (iv)  $3^{-\frac{1}{3}}$

5. ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

(i)  $64^{\frac{2}{3}}$  (ii)  $16^{\frac{1}{4}}$  (iii)  $125^{\frac{1}{3}}$  (iv)  $81^{-\frac{1}{4}}$  (v)  $\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{4}{9}}$   
 (vi)  $9^{-\frac{1}{2}}$  (vii)  $\left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$  (viii)  $\left(\frac{1}{216}\right)^{-\frac{2}{3}}$  (ix)  $\left(\frac{2}{5^3}\right)^{-6}$  (x)  $\left(\sqrt[4]{\frac{2}{3}}\right)^{16}$

6. ସରଳ କର :

(i)  $\sqrt{2} \times \sqrt[3]{2} \times \sqrt[6]{2}$  (ii)  $\left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}}$  (iii)  $\left(\sqrt[n]{a^{\sqrt{n}}}\right)^{\sqrt{n}}$  ( $a > 0, n \in \mathbb{N}$ )

(iv)  $\left(\sqrt[3]{3^{\sqrt[3]{3}}}\right)^{\sqrt[3]{3^2}}$  (v)  $4^2 \times 8^{1-4a} \times 16^{3a-1}$  (vi)  $27^{\frac{1}{3}} \times \sqrt{\frac{1}{9}} \div 81^{-\frac{1}{4}}$

(vii)  $\left(\frac{4}{9}\right)^{\frac{1}{2}} \times 4^0 \times \left(1\frac{1}{3}\right)^{-1}$  (viii)  $\left(a^{\frac{3}{4}} b^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{3}}$  ( $a > 0, b > 0$ )

7. କେଉଁଟି ଠିକ୍ ?

(i)  $\sqrt[4]{4} > \sqrt[3]{3}$  (ii)  $\sqrt[4]{4} = \sqrt[3]{3}$  (iii)  $\sqrt[4]{4} < \sqrt[3]{3}$

(ସୁଚନା - ଉଚ୍ଚୟତର ଦ୍ୱାଦଶ ଘାତ ନେଇ ତୁଳନା କରି)

8. ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$$(i) \left( a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}} \right) \left( a^{\frac{1}{2}} - b^{\frac{1}{2}} \right) \quad (a > 0, b > 0), \quad (ii) \left( 1 - a^{\frac{1}{4}} \right) \left( 1 + a^{\frac{1}{4}} \right) \left( 1 + a^{\frac{1}{2}} \right) \quad (a > 0)$$

$$(iii) \left( 1 + a^{\frac{1}{2}} \right) \left( 1 + a^{\frac{1}{4}} \right) \left( 1 + a^{\frac{1}{8}} \right) \left( 1 + a^{\frac{1}{16}} \right) \left( 1 + a^{\frac{1}{32}} \right) \left( 1 - a^{\frac{1}{32}} \right) \quad (a > 0)$$

$$(iv) \left( \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} \right) \left( \sqrt[3]{x^2} - \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2} \right) \quad (x > 0, y > 0)$$

$$(v) \left( x^{-1} + x^{\frac{-1}{2}} \cdot y^{\frac{-1}{2}} + y^{-1} \right) \left( x^{-1} - x^{\frac{-1}{2}} \cdot y^{\frac{-1}{2}} + y^{-1} \right) \quad (x > 0, y > 0)$$

9. ସରଳ କର :

$$(i) \sqrt[3]{x^{\frac{1}{2}} y^{\frac{2}{3}} z^{\frac{1}{3}}} \div (xyz)^{\frac{1}{3}}, \quad (ii) \sqrt[3]{x^2 y^4 z^{-1}} + \sqrt{x^{-\frac{2}{3}} y^2 z^{-\frac{1}{3}}}, \quad (iii) \sqrt{a^3 b^{-\frac{2}{3}} c^{\frac{7}{6}}} \div \sqrt{a^4 b^{-1} c^{-\frac{5}{4}}}$$

10.  $\{x, y, z, a, b, c\} \subset \mathbb{R}$  ଓ  $x > 0, y > 0, z > 0$  ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ,

$$(i) \sqrt{x^{-1}y} \times \sqrt{y^{-1}z} \times \sqrt{z^{-1}x} = 1$$

$$(ii) \left( \frac{x^a}{x^b} \right)^{\frac{1}{ab}} \times \left( \frac{x^b}{x^c} \right)^{\frac{1}{bc}} \times \left( \frac{x^c}{x^a} \right)^{\frac{1}{ca}} = 1 \quad (a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0)$$

$$(iii) \left( \frac{1}{x^{a-b}} \right)^{\frac{1}{b-c}} \times \left( \frac{1}{x^{b-c}} \right)^{\frac{1}{c-a}} \times \left( \frac{1}{x^{c-a}} \right)^{\frac{1}{a-b}} = 1 \quad [a, b \text{ ଓ } c \text{ ର ମୂଲ୍ୟ ଅସମାନ}]$$

11. (i)  $a = 2^{\frac{1}{3}} - 2^{-\frac{1}{3}}$  ହେଲେ, ପ୍ରମାଣ କର ଯେ,  $2a^3 + 6a = 3$

$$(ii) a = x^{\frac{1}{3}} - x^{-\frac{1}{3}}, \quad x > 0 \quad \text{ହେଲେ, ପ୍ରମାଣ କର ଯେ, } a^3 + 3a = x - \frac{1}{x}$$

$$(iii) x = 3^{\frac{1}{3}} + 3^{-\frac{1}{3}} \quad \text{ହେଲେ, ପ୍ରମାଣ କର ଯେ, } 3x^3 - 9x - 10 = 0$$

12. ଯଦି  $a = b^c, b = c^a, c = a^b$  ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରମାଣ କରିଯେ,  $abc = 1$

$[a, b, c \in \mathbb{R}^+, a \neq 1, b \neq 1, c \neq 1]$

$$13. (i) \quad \text{ଯଦି } 3^x = 4^y = 12^z \text{ ହୁଏ, ତେବେ } z = \frac{xy}{x+y}$$

$$(ii) \quad \text{ଯଦି } 2^x = 3^y = 6^z \text{ ହୁଏ, ତେବେ } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0 \quad (x, y, z \in \mathbb{R})$$

3.6. ଘାତକୀୟ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ (Solution of Exponential Equations) :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର।

$$(i) 3^{x+1} = 9 \quad (ii) 2^x - 4^{2x-1} = 0$$

$$(iii) a^x = a^{2y} \quad (a > 0, a \neq 1) \quad (iv) \begin{cases} 2^{2x-y-3} = 1 \\ 3^{x+2y-1} = 27 \end{cases}$$

ଏ ସମସ୍ତ ସମୀକରଣରେ ଘାତକୀୟ ଅଞ୍ଚାତ ରାଶିମାନଙ୍କରୀରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ସଂଜ୍ଞା : ଅଞ୍ଚାତ ରାଶିଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣକୁ ଘାତକୀୟ ସମୀକରଣ (exponential equation) କୁହାଯାଏ ।

ଘାତତରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ କେତେକ ଘାତକୀୟ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବା, ତାହା ହେଉଛି,  $a > 0, a \neq 1; x, y \in R$  ହେଲେ  $a^x = a^y \Rightarrow x = y$  ।

ଦ୍ରୁଷ୍ଟବ୍ୟ : ପରିମେଯ ତଥା ବାସ୍ତବ ଘାତକ ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତତରୁ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଧନାମୂଳ ଆଧାର ନେଇଥିଲେ ।  $a = 1$  ହେଲେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ  $x$  ଓ  $y$  ପାଇଁ ମଧ୍ୟ  $a^x = a^y$  ହେବା । ତେଣୁ  $a^x = a^y \Rightarrow x = y$  ସତ୍ୟ ହେବନାହିଁ । ସେହି କାରଣରୁ  $a > 0$  ଓ  $a \neq 1$  ସର୍ବରୂପେ ନିଆଗଲା ।

ଉଦ୍ଦାହରଣ - 12 : ସମାଧାନ କର :  $2^x - 4^{2x-1} = 0$

$$\text{ସମାଧାନ : } 2^x - 4^{2x-1} = 0 \Rightarrow 2^x = 4^{2x-1} \Rightarrow 2^x = (2^2)^{2x-1} \Rightarrow 2^x = 2^{2(2x-1)}$$

$\Rightarrow 2^x = 2^{4x-2} [a^x = a^y \Rightarrow x = y \quad (a > 0, a \neq 1)]$  ଏହି ସ୍ଵତ୍ତର ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵକୁ ସମାନ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତଗାଣି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଗଲା ।

$$\Rightarrow x = 4x - 2 \Rightarrow 3x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{3} \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଉଦ୍ଦାହରଣ - 13 :

$$\text{ସମାଧାନ କର : } 3^{x+2} + 3^{x+4} = 810$$

$$\text{ସମାଧାନ : } 3^{x+2} + 3^{x+4} = 3^{x+2} + 3^{x+2} \times 3^2 = 3^{x+2} (1 + 3^2) = 10 \times 3^{x+2}$$

$$\text{ତେଣୁ, } 3^{x+2} + 3^{x+4} = 810 \Rightarrow 10 \times 3^{x+2} = 810 \Rightarrow 3^{x+2} = 81$$

$$\Rightarrow 3^{x+2} = 3^4 \Rightarrow x + 2 = 4 \Rightarrow x = 2 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଉଦ୍ଦାହରଣ - 14 : ସମାଧାନ କର :  $2^{x+2} \times 3^{x-2} = 96$

$$\text{ସମାଧାନ : } 2^{x+2} \times 3^{x-2} = 96$$

$$\Rightarrow 2^{x+2} \times 3^{x-2} = 2^5 \times 3 \Rightarrow \frac{2^{x+2} \times 3^{x-2}}{2^5 \times 3} = 1 \Rightarrow 2^{x-3} \times 3^{x-3} = 1$$

$$\Rightarrow (2 \times 3)^{x-3} = 6^0 \Rightarrow 6^{x-3} = 6^0 \Rightarrow x - 3 = 0 \Rightarrow x = 3 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଉଦ୍ବାହରଣ - 15 : ସମାଧାନ କର  $2^{3-x} \times 4^{2x-1} = 16$

$$\begin{aligned}\text{ସମାଧାନ : } & 2^{3-x} \times 4^{2x-1} = 2^{3-x} \times (2^2)^{2x-1} = 2^{3-x} \times 2^{2(2x-1)} \\ & = 2^{3-x} \times 2^{4x-2} = 2^{3-x+4x-2} = 2^{3x+1}\end{aligned}$$

$$ତେଣୁ 2^{3-x} \times 4^{2x-1} = 16 \Rightarrow 2^{3x+1} = 16 \Rightarrow 2^{3x+1} = 2^4$$

$$\Rightarrow 3x + 1 = 4 \Rightarrow 3x = 3 \Rightarrow x = 1 \quad (ଉଚିତ)$$

ଉଦ୍ବାହରଣ - 16 : ସମାଧାନ କର :  $3^x - 9^y = 0$  ଏବଂ  $x + y = 3$

$$\begin{aligned}\text{ସମାଧାନ : } & 3^x - 9^y = 0 \Rightarrow 3^x = 9^y \\ & \Rightarrow 3^x = (3^2)^y \Rightarrow 3^x = 3^{2y} \Rightarrow x = 2y\end{aligned}$$

$$x = 2y \text{ ଏବଂ } x + y = 3 \text{ ରୁ ପାଇବା } 2y + y = 3 \Rightarrow 3y = 3 \Rightarrow y = 1$$

$$\therefore x = 2y = 2 \times 1 = 2$$

$$\therefore x = 2 \text{ ଓ } y = 1 \quad (ଉଚିତ)$$

### ଅନୁଶୀଳନ 1 - 3(c)

1. କେଉଁଟି ଗ୍ରାଫାଙ୍କ୍ୟ ସମୀକରଣ ?

$$(i) 4^x = 2^{2x} \quad (ii) 4^x = 2^2 \quad (iii) 3^{2x^2} = 4^2$$

2. ଅଞ୍ଚାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖ : (i)  $3^x = \frac{1}{9}$ , (ii)  $5^y = 1$ , (iii)  $2^x = \sqrt{2}$

3. ଅଞ୍ଚାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : (i)  $3^{x+2} = 81$ , (ii)  $5^y = 5\sqrt{5}$ , (iii)  $\frac{1}{2^x} = 16$

4. ସମାଧାନ କର : (i)  $2^{2x} = 16$ , (ii)  $\frac{1}{7^{1-y}} = 49$ , (iii)  $6^x = \frac{1}{1296}$

5. ସମାଧାନ କର :

$$(i) 5 \times 25^x = 125^{x-1}, (ii) 2^{x-3} - 4^{x+1} = 0, (iii) 3^{x+5} = 3^{x+3} + \frac{8}{3}, (iv) (\sqrt{2})^{x+2} = (2\sqrt{2})^{3x}$$

$$(v) (\sqrt[3]{3})^{x+5} = (\sqrt[3]{3})^{2x}, (vi) 2^{x+2} \times 3^{x-1} = 288, (vii) 3^{x+1} \times 5^{1-x} = 9, (viii) 3^{y+2} \times 27^{3-y} = 2187$$

6. ସମାଧାନ କର ।

$$(i) 5^x - 25^{y-1} = 0, 2x + y = 11 \quad (ii) 2^x + 3^y = 7, 2^x - 3^y = 1$$

$$(iii) 2^{2x-y-2} = 32, 5^{x+2y+1} = 25 \quad (iv) 8^x = 4^y, 9^x = 3^{y+1}$$

## 3.7. ଲଗାରିଦମ୍ (Logarithm) :

ଲଗାରିଦମ୍ ବିଶେଷତା ହେଲା, ସାନ ବା ବଡ଼ ଯେ କୌଣସି ଧନାମୂଳ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ ଆଧାରର ଘାତଗାଣୀ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ । ଫଳରେ ଶୁଭ ସାନ ବା ଶୁଭ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଗୁଣନ, ହରଣ, ଘାତ ବା ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଲଗାରିଦମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ କରାଯାଇପାରେ ।

ସୁଚିଳ୍ୟାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ମର୍ତ୍ତବ୍ୟନର ଜମିଦାର John Napier (1550-1617), 1614 ଖ୍ରୀଷ୍ଟବରେ ଲଗାରିଦମ୍ ଉତ୍ତାବନ କରିଥିଲେ ।

ତୁମେ ଜାଣ ଯେ  $8 = 2^3$ , ଏକ ଘାତାଙ୍କୀୟ ଭକ୍ତି । ଏହି ଉକ୍ତିରେ 8କୁ 2 ଓ 3 ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଇ । ସେହିପରି ତୁମେ ଜାଣ ଯେ  $2 = \sqrt[3]{8}$ , ଏକ ମୂଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭକ୍ତି । ଏହି ଉକ୍ତିରେ 2କୁ 8 ଓ 3 ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଇ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ସ୍ଵତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବେ ଯେ 3କୁ 2 ଓ 8 ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ କି ? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହଁ ଏବଂ ତାହା  $3 = \log_2 8$  ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଏଠାରେ 3 ହେଉଛି, 2 ଆଧାରରେ 8ର ଲଗାରିଦମ୍  $\log_2 8 = 3$  ହେଉଛି ଏକ ଲଗାରିଦମୀୟ ଭକ୍ତି ଏବଂ  $8 = 2^3$  ହେଉଛି ଏକ ଘାତାଙ୍କୀୟ ଭକ୍ତି ।  $8 = 2^3$  ବା  $2 = \sqrt[3]{8}$  ବା  $3 = \log_2 8$  ଟିନୋଟିଯାକ ହେଉଛି ଏକାର୍ଥବୋଧକ ଭକ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ 2, 3 ଓ 8 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଟି ବର୍ଣ୍ଣାଯାଇଥାଇ ।

**ଲଗାରିଦମ୍ ସଂଜ୍ଞା :**

$a, x, y$  ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଓ  $a > 0, y > 0$  ଏବଂ  $a \neq 1$  ହେଲେ,  $a^x = y \Leftrightarrow x = \log_a y$

' $x = \log_a y$ ' କୁ "x = ଆଧାର a ରେ yର ଲଗାରିଦମ୍" – ଏହିପରି ପଢାଯାଏ ।

[ସୁଚିଳ୍ୟା : ଏକ ଘାତାଙ୍କୀୟ ଭକ୍ତିର ଘାତାଙ୍କୁ ମାନ ଓ ଆଧାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଲଗାରିଦମ୍ କୁହାଯାଏ ।]

ଏହି ସଂଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଆମେ ପାରିବା –  $\log_3 27 = 3, \log_{10} 100 = 2, \log_2 \sqrt{2} = \frac{1}{2}$  ରତ୍ୟାଦି ।

**ତ୍ରୁଟିବ୍ୟ :**

(i)  $y$  ଏକ ଧନାମୂଳ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, ତା'ର ଲଗାରିଦମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛେବ । କିନ୍ତୁ  $y$  ରଣାମୂଳ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବା ଶୁନ୍ନ ହେଲେ,  $\log_y y$  ( $a > 0, a \neq 1$ ) ନିରଥ୍ରକ ଅର୍ଥ ।

(ii) ଲଗାରିଦମ୍ ସଂଜ୍ଞାରେ  $a > 0, a \neq 1$  ନିଆଯାଇଥାଇ । କାରଣ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା  $x$  କ୍ଷେତ୍ରରେ  $a > 0$  ନେଲେ ହିଁ  $a^x = y$  ପାଇପାରିବ ।

ପୁନଃ  $a = 1$  ହେଲେ, ଯେଉଁ ବିଗୋଧାଭାଷ (contradiction) ସୃଷ୍ଟିହେବ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ।

$a = 1$  ହେଲେ,  $1^x = 1 \Rightarrow 5 = \log_1 1$  ଏବଂ  $1^x = 1 \Rightarrow 6 = \log_1 1$

ତେଣୁ  $5 = 6$ , ଏକ ବିଗୋଧାଭାଷ ସେଥୁପାଇଁ ସଂଜ୍ଞାରେ  $a \neq 1$  ନିଆଯାଇଥାଇ ।

ମନେରଖ : ଯେହେତୁ  $a^1 = a$  ଏବଂ  $a^0 = 1$ , ( $a > 0, a \neq 1$ ) ତେଣୁ  $\log_a a = 1$  ଏବଂ  $\log_a 1 = 0$   
ଉଦାହରଣ - 1 :

ନିମ୍ନ ଘାତାଙ୍କୀୟ ଉଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗାରିଦମୀୟ ଉଚ୍ଚିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

$$(i) 5^x = y \quad (ii) 2^5 = 32 \quad (iii) 4^3 = 64 \quad (iv) \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \quad (v) 10^{-3} = 0.001$$

ସମାଧାନ : (i)  $5^x = y \Rightarrow x = \log_5 y$     (ii)  $2^5 = 32 \Rightarrow 5 = \log_2 32$

$$(iii) 4^3 = 64 \Rightarrow 3 = \log_4 64 \quad (iv) \left(\frac{1}{8}\right)^{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{3} = \log_{\frac{1}{8}} \left(\frac{1}{2}\right)$$

$$(v) 10^{-3} = 0.001 \Rightarrow -3 = \log_{10} 0.001$$

ଉଦାହରଣ - 2 :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲଗାରିଦମୀୟ ଉଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ଉଚ୍ଚିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

$$(i) \log_2 4 = 2, (ii) \log_{\sqrt{3}} 9 = 4, (iii) \log_5 125 = 3, (iv) \log_{0.4} 0.16 = 2, (v) \log_{10} 0.1 = -1$$

ସମାଧାନ : (i)  $2^2 = 4$ , (ii)  $(\sqrt{3})^4 = 9$ , (iii)  $5^3 = 125$ , (iv)  $(0.4)^2 = 0.16$ , (v)  $(10)^{-1} = 0.1$

ଉଦାହରଣ - 3 : ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : (i)  $\log_2 128$ , (ii)  $\log_3 243$ , (iii)  $\log_{\frac{1}{6}} \frac{1}{36}$

ସମାଧାନ :

$$(i) \text{ ମନେକର } \log_2 128 = x \Rightarrow 2^x = 128 = 2^7 \Rightarrow x = 7 \Rightarrow \log_2 128 = 7$$

$$(ii) \text{ ମନେକର } \log_3 243 = x \Rightarrow 3^x = 243 = 3^5 \Rightarrow x = 5 \Rightarrow \log_3 243 = 5$$

$$(iii) \text{ ମନେକର } \log_{\frac{1}{6}} \frac{1}{36} = y \Rightarrow \left(\frac{1}{6}\right)^y = \frac{1}{36} = \left(\frac{1}{6}\right)^2 \Rightarrow y = 2 \Rightarrow \log_{\frac{1}{6}} \frac{1}{36} = 2$$

### ଆବଶ୍ୟକତା - 3(d)

ଲଗାରିଦମୀୟ ଉଚ୍ଚିରେ ପ୍ରକାଶ କର :

$$(i) 5^3 = 125 \quad (ii) 8^2 = 64 \quad (iii) 15^2 = 225 \quad (iv) 16^{\frac{3}{4}} = 8 \quad (v) 36^{\frac{1}{2}} = 6 \quad (vi) 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

$$(vii) 9^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{27} \quad (viii) 10^x = 150 \quad (ix) x^3 = y \quad (x > 0, x \neq 1) \quad (x) 10^{-2} = 0.01$$

$$(xi) (\sqrt{2})^5 = 8 \quad (xii) 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

2. ଘାତାଙ୍କୀୟ ଉଚ୍ଚିରେ ପ୍ରକାଶ କର :

$$(i) \log_5 25 = 2 \quad (ii) \log_{10} 1000 = 3 \quad (iii) \log_{11} 1331 = 3 \quad (iv) \log_{\sqrt{2}} 4 = 4$$

$$(v) \log_{0.5} 0.125 = 3 \quad (vi) \log_2 \frac{4}{9} = 2 \quad (vii) \log_{10} 0.01 = -2 \quad (viii) \log_{10} 0.0001 = -4$$

3. ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$$(i) \log_{10} 10 \quad (ii) \log_{10} 100 \quad (iii) \log_3 243 \quad (iv) \log_{\frac{1}{7}} \frac{1}{49}$$

$$(v) \log_{0.4} 0.16 \quad (vi) \log_2 \log_2 4 \quad (vii) \log_{0.01} 1 \quad (viii) \log_{0.01} 0.01$$

4. 'x' ର ମାନ ସ୍ଥିର କର :

$$(i) \log_4 64 = x \quad (ii) \log_{\sqrt{3}} 3 = x \quad (iii) \log_3 x = 3 \quad (iv) \log_5 x = 2$$

$$(v) \log_{\sqrt{2}} x = 2 \quad (vi) \log_x 5 = 1 \quad (vii) \log_x 64 = 6 \quad (viii) \log_x 1 = 0$$

5. ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚିଲାଗି T ଓ ଭୁଲ ଉଚ୍ଚିଲାଗି F ଲେଖ :

$$(i) \log_{0.2} 0.2 = 0.1 \quad (ii) \log_6 12 = 2 \quad (iii) \log_2 \frac{1}{8} = -3 \quad (iv) \log_{\frac{1}{2}} \frac{1}{8} = 3$$

$$(v) \sqrt{16} = 4 \Leftrightarrow \log_{16} 4 = \frac{1}{2} \quad (vi) 10^{-3} = 0.001 \Leftrightarrow \log_{10} 0.001 = 10$$

$$(vii) a^x = y \quad (a > 0, a \neq 1) \Leftrightarrow \log_a x = y$$

3.8. ଲଗାରିଦମ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିୟମ (Rules of Logarithm) :

ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଲଗାରିଦମ ପ୍ରକିଳ୍ପ ଘାତ ପ୍ରକିଳ୍ପ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏଣୁ ଘାତାଙ୍କୀୟ ନିୟମରୁ ଲଗାରିଦମ ସମ୍ବନ୍ଧ ନିୟମ ମିଳିଥାଏ । ସେବୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ବିଆଗଲା ।

ଉପପାଦ୍ୟ : a, m, n ଧନାମୂଳ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ a ≠ 1 ହେଲେ, (i)  $\log_a (mn) = \log_a m + \log_a n$ ,

$$(ii) \log_a \left( \frac{m}{n} \right) = \log_a m - \log_a n \text{ ଏବଂ } (iii) \log_a m^p = p \log_a m \quad (p \in \mathbb{R})$$

ପ୍ରମାଣିତ :

$$(i) \text{ମନେକର } \log_a m = x, \log_a n = y \text{ ଏବଂ } \log_a (mn) = z$$

$$\text{ସଂଖ୍ୟାନୂସାରେ } m = a^x, n = a^y \text{ ଏବଂ } mn = a^z$$

$$\Rightarrow a^z = mn = a^x \cdot a^y = a^{x+y} \Rightarrow z = x + y$$

$$\therefore \log_a (mn) = \log_a m + \log_a n \quad (\text{ପ୍ରମାଣିତ})$$

$$\text{ଅନୁସିଦ୍ଧାତ୍ମକ : } \log_a (mnp \dots) = \log_a m + \log_a n + \log_a p + \dots$$

$$(m, n, p \dots, a \text{ ଧନାମୂଳ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ } a \neq 1)$$

$$(ii) \text{ मनेकर } \log_a m = x, \log_a n = y \text{ एवं } \log_a \left( \frac{m}{n} \right) = z$$

$$\text{संज्ञानुसारे } m = a^x, n = a^y \text{ एवं } \frac{m}{n} = a^z$$

$$\Rightarrow a^z = \frac{m}{n} = \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y} \Rightarrow z = x - y$$

$$\therefore \log_a \left( \frac{m}{n} \right) = \log_a m - \log_a n \quad (\text{प्रमाणित})$$

$$(iii) \text{ मनेकर } \log_a m = x \text{ एवं } \log_a m^p = z$$

$$\text{संज्ञानुसारे } m = a^x \text{ एवं } m^p = a^z$$

$$\therefore a^z = m^p = (a^x)^p = a^{xp} \Rightarrow z = xp \Rightarrow z = px$$

$$\therefore \log_a (m)^p = p \log_a m \quad (\text{प्रमाणित})$$

### 3.9. आधार परिवर्तन (Change of base) :

कोणती ही धनामूक बास्तव संख्या 'm' र लगारिदम् निश्चय कलावेळे यदि आधार 'a' कृ परिवर्तन करायाऱ्या आधार 'b' निआयाए, तेवें उक्त लगारिदम् मध्ये थळा समस्तचि

$$\log_a m = \log_b m \times \log_a b \quad (a \neq 1, b \neq 1 \text{ ओ } a, b \text{ धनामूक संख्या।})$$

प्रमाण :

$$\text{मनेकर } \log_a m = x, \log_b m = y \text{ एवं } \log_a b = z$$

$$\text{तेशु संज्ञानुसारे } a^x = m, b^y = m \text{ एवं } a^z = b$$

$$a^x = m = b^y = (a^z)^y = a^{yz} \quad [b = a^z \text{ केखायिवाच्य}]$$

$$\Rightarrow x = yz \Rightarrow \log_a m = \log_b m \times \log_a b \quad \dots \quad (i) \quad (\text{प्रमाणित})$$

$$\text{अनुसिद्धान्त - 1 : } \log_a b \times \log_b a = 1$$

$$\text{प्रमाण : मनेकर } \log_a b = m \Rightarrow a^m = b \Rightarrow a = b^{\frac{1}{m}}$$

$$\text{एवं } \log_b a = n \Rightarrow b^n = a$$

$$\therefore b^{\frac{1}{m}} = b^n \Rightarrow \frac{1}{m} = n \Rightarrow mn = 1 \quad \text{अर्थात् } \log_a b \times \log_b a = 1 \quad (\text{प्रमाणित})$$

ब.द्र. : 3.9 र अनुसिद्धान्त-1र प्रमाण पाल्य (i)रे  $m = a$  र प्रयोग मध्य होउपारे।

$$\text{अनुसिद्धान्त-2 : } \log_a m = \frac{\log_b m}{\log_b a}$$

$$\text{अनुसिद्धान्त-3 : } \log_a m = \log_b m \times \log_c b \times \log_c a$$

ଉଦ୍‌ବାହରଣ - 4 :

$a > 0 \text{ } \& \text{ } a \neq 1$  ନେଇ ନିମ୍ନ ଲଗାରିଦମଗୁଡ଼ିକୁ ଶୌକିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଲଗାରିଦମରେ ପ୍ରକାଶ କର :

$$(i) \log_a 6 \quad (ii) \log_a 30 \quad (iii) \log_a 2 \frac{1}{7} \quad (iv) \log_a 72$$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} (i) \quad \log_a 6 &= \log_a (2 \times 3) = \log_a 2 + \log_a 3 && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (i)} \\ (ii) \quad \log_a 30 &= \log_a (2 \times 3 \times 5) = \log_a 2 + \log_a 3 + \log_a 5 && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (i) ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ} \\ (iii) \quad \log_a 2 \frac{1}{7} &= \log_a \frac{15}{7} = \log_a 15 - \log_a 7 && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (ii)} \\ &= \log_a (3 \times 5) - \log_a 7 = \log_a 3 + \log_a 5 - \log_a 7 && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (i)} \\ (iv) \quad \log_a 72 &= \log_a (2^3 \times 3^2) = \log_a 2^3 + \log_a 3^2 && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (i)} \\ &= 3 \log_a 2 + 2 \log_a 3 && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (iii)} \end{aligned}$$

(ଉଚର)

ଉଦ୍‌ବାହରଣ - 5 :

ଘାତାଙ୍କୀୟ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କର : ( $a, x, y > 0, a \neq 1$ )

$$(i) \quad 2 \log_a x + 3 \log_a y = 5 \quad (ii) x \log_a 5 - y \log_a 6 = 2$$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} (i) \quad 2 \log_a x + 3 \log_a y &= 5 \Rightarrow \log_a x^2 + \log_a y^3 = 5 && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (iii)} \\ &\Rightarrow \log_a (x^2 y^3) = 5 \Rightarrow x^2 y^3 = a^5 \text{ (ଉଚର)} && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (i) (ସଂଖ୍ୟା)} \\ (ii) \quad x \log_a 5 - y \log_a 6 &= 2 \Rightarrow \log_a 5^x - \log_a 6^y = 2 && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (iii)} \\ &\Rightarrow \log_a \left( \frac{5^x}{6^y} \right) = 2 \Rightarrow \frac{5^x}{6^y} = a^2 \text{ or } 5^x = a^2 \cdot 6^y \text{ (ଉଚର)} && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (ii) (ସଂଖ୍ୟା)} \\ &&& (\text{ଉଚର}) \end{aligned}$$

ଉଦ୍‌ବାହରଣ - 6 : ଏକପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର :

$$\begin{aligned} (i) \quad \log_b 2 + \log_b 3 + \log_b x && [x > 0, b > 0, b \neq 1] \\ (ii) \quad \log_a 15 - \log_a 3 && [a > 0, a \neq 1] \\ (iii) \quad 3 \log_a 2 + 2 \log_a 3 + \log_a 5 - \log_a 9 && [a > 0, a \neq 1] \end{aligned}$$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} (i) \quad \log_b 2 + \log_b 3 + \log_b x &= \log_b (2 \times 3 \times x) \text{ ଉପପାଦ୍ୟ (i)ର ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ} \\ &= \log_b 6x && (\text{ଉଚର}) \\ (ii) \quad \log_a 15 - \log_a 3 && \\ &= \log_a \frac{15}{3} = \log_a 5 && \text{ଉପପାଦ୍ୟ (ii)} && (\text{ଉଚର}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad & 3 \log_2 2 + 2 \log_2 3 + \log_2 5 - \log_2 9 \\
 & = \log_2 2^3 + \log_2 3^2 + \log_2 5 - \log_2 9 \quad \text{ଉପପାଦ୍ୟ (iii)} \\
 & = \log_2 (2^3 \times 3^2 \times 5) - \log_2 9 \quad \text{ଉପପାଦ୍ୟ (i) ର ଅନୁସିଙ୍ଗାତ୍} \\
 & = \log_2 \left( \frac{2^3 \times 3^2 \times 5}{9} \right) = \log_2 40 \quad \text{ଉପପାଦ୍ୟ (ii)} \quad \text{(ଉଚର)}
 \end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ - 7 : ସରଳ କର : (i)  $\frac{\log_2 8}{\log_2 16}$  (ii)  $\log_2 \sqrt{6} + \log_2 \sqrt{\frac{2}{3}}$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned}
 \text{(i)} \quad & \frac{\log_2 8}{\log_2 16} = \frac{\log_2 2^3}{\log_2 2^4} = \frac{3 \log_2 2}{4 \log_2 2} = \frac{3 \times 1}{4 \times 1} = \frac{3}{4} \\
 \text{(ii)} \quad & \log_2 \sqrt{6} + \log_2 \sqrt{\frac{2}{3}} = \log_2 (6)^{\frac{1}{2}} + \log_2 \left( \frac{2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} \\
 & = \frac{1}{2} \log_2 6 + \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{2}{3} \right) = \frac{1}{2} \log_2 (2 \times 3) + \frac{1}{2} \log_2 \left( \frac{2}{3} \right) \\
 & = \frac{1}{2} (\log_2 2 + \log_2 3) + \frac{1}{2} (\log_2 2 - \log_2 3) = 2 \cdot \frac{1}{2} \log_2 2 = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = 1 \quad \text{(ଉଚର)}
 \end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ - 8 :  $3^{\log_3 2}$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

ସମାଧାନ :

$$\text{ମନେକର } x = 3^{\log_3 2}$$

$$\therefore \log_3 x = \log_3 2 \Rightarrow \log_3 x = \log_3 (2^5) \Rightarrow x = 2^5 = 32$$

$$\therefore 3^{\log_3 2} \text{ ର ମାନ} = 32 \quad \text{(ଉଚର)}$$

ଉଦାହରଣ - 9 : ପ୍ରମାଣ କର :  $\log_a x = \log_a y \Rightarrow x = y$  ( $x > 0, y > 0$ )

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned}
 \log_a x = \log_a y \Rightarrow \log_a x - \log_a y = 0 \Rightarrow \log_a \left( \frac{x}{y} \right) = 0 \quad \text{ଉପପାଦ୍ୟ (ii)} \\
 \Rightarrow \frac{x}{y} = a^0 = 1 \Rightarrow x = y \quad \text{(ଲଗାରିଦମର ସଂଜ୍ଞା) (ପ୍ରମାଣିତ)}
 \end{aligned}$$

ଉଦାହରଣ - 10 :

$$\text{ଦର୍ଶାଏ ଯେ, } \log_b a \times \log_c b \times \log_a c = 1$$

ସମାଧାନ :

$$\text{ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ, } \log_b a = \frac{\log_e a}{\log_e b} \quad \text{(ଅନୁସିଙ୍ଗାତ୍-2)}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{বামপক্ষ} &= \log_a b \times \frac{1}{\log_c b} \times \log_c b \times \log_a c \\ &= \log_a b \times \log_a c = 1\end{aligned}\quad (\text{অনুবিক্ষাত-1}) \quad (\text{প্রমাণিত})$$

উদাহরণ - 11 :

যদি  $x = \log_{(2a)} a$ ,  $y = \log_{(3a)} 2a$ ,  $z = \log_{(4a)} 3a$  তেবে প্রমাণ কর যে  $1 + xyz = 2yz$

প্রমাণ :

$$\begin{aligned}\text{বামপক্ষ} &= 1 + xyz = 1 + \log_{2a} a \cdot \log_{3a} 2a \cdot \log_{4a} 3a = 1 + (\log_{2a} a \cdot \log_{3a} 2a) \cdot \log_{4a} 3a \\ &= 1 + \log_{3a} a \cdot \log_{4a} 3a = 1 + \log_{4a} a = \log_{4a} 4a + \log_{4a} a \\ &= \log_{4a} (4a \times a) = \log_{4a} (4a^2) = \log_{4a} (2a)^2 = 2 \log_{4a} (2a)\end{aligned}$$

$$\text{দক্ষিণপক্ষ} = 2yz = 2(\log_{3a} 2a \cdot \log_{4a} 3a) = 2 \log_{4a} 2a = \text{বামপক্ষ} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

### অনুশীলন 1 - 3(e)

1.  $a > 0, a \neq 1$  নেক নিম্ন লগারিদমগুଡ়িকু মৌলিক ঘংখ্যামানকর লগারিদমে প্রকাশ কর।

- |                   |                             |                               |                   |                   |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| (i) $\log_a 27$   | (ii) $\log_a 56$            | (iii) $\log_a \frac{8}{9}$    | (iv) $\log_a 243$ | (v) $\log_a 105$  |
| (vi) $\log_a 108$ | (vii) $\log_a \frac{4}{27}$ | (viii) $\log_a \frac{25}{98}$ | (ix) $\log_a 0.3$ | (x) $\log_a 0.04$ |

2. এহের অপসারণ করি প্রত্যেককু  $\log_a N$  রূপে প্রকাশ কর : ( $a > 0, a \neq 1$ )

- |                                       |  |   |                               |                             |
|---------------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------------|
| (i) $2 \log_a 5$                      | (ii) $3 \log_a 2$  | (iii) $\frac{1}{2} \log_a 25$                       | (iv) $\frac{1}{3} \log_a 729$ | (v) $\frac{1}{2} \log_a 64$ |
| (vi) $-2 \log_a 4$                    | (vii) $3 \log_a x^2$ ( $x > 0$ )                               | (viii) $\frac{1}{2} \log_a (x^2y^4)$ ( $x, y > 0$ ) |                               |                             |
| (ix) $-2 \log_a \sqrt{x}$ ( $x > 0$ ) | (x) $-\frac{1}{3} \log_a \frac{x}{y}$ ( $x, y > 0, x \neq y$ ) |   |                               |                             |

3. গোটিএ লগপদক্ষে প্রকাশ করি : [ $a > 0, a \neq 1$ ]

- |   |   |
|---|---|
| (i) $3 \log_a 2 + 3 \log_a 5$   | (ii) $4 \log_a 10 - 3 \log_a 5$                             |
| (iii) $2 \log_a 2 + 3 \log_a 5 - 2 \log_a 10$   | (iv) $2 \log_a 8 - 4 \log_a 6 + 3 \log_a 9$                 |
| (v) $\frac{1}{2} \log_a 9 + \frac{1}{3} \log_a 64 - \frac{1}{2} \log_a 36$                      | (vi) $3 \log_a x + 2 \log_a y - \log_a z$ ( $x, y, z > 0$ ) |
| (vii) $\frac{1}{3} \log_a x^6 - \frac{1}{2} \log_a \frac{1}{x^6} + \frac{1}{2} \log_a (x^6y^4)$ | [ $x, y > 0$ ]  |

[ 58 ]

4. ଘାତାଙ୍କୀୟ ଉଚ୍ଚିରେ ପ୍ରକାଶ କର : ( $a > 0, a \neq 1$ )
- $\log_a x + \log_a y = 2$  ( $x, y > 0$ )
  - $\log_a m + 2 \log_a n = 3$  ( $m, n > 0$ )
  - $x \log_a 5 - y \log_a 6 = 2$
  - $1 + x \log_a 2 = 0$
  - $x \log_a x + y \log_a y + z \log_a z = 0$  ( $x, y, z > 0$ )
5. ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :
- $5^{\log_3 3}$
  - $6^{4 \log_6 2}$
  - $\log_4 (2^6)$
  - $\log_2 \log_2 \log_2 16$
6. ସରଳ କର :
- $\frac{1}{2} \log_a 9 + \frac{1}{3} \log_a 64 - \frac{1}{2} \log_a 36$  ( $a > 0, a \neq 1$ )
  - $\log_2 \sqrt{6} + \log_2 \sqrt{\frac{2}{3}}$
  - $\frac{\log_a 36 + \log_a 25}{\log_a 2 + \log_a 3 + \log_a 5}$  ( $a > 0, a \neq 1$ )
  - $\frac{\log_5 25 + \log_5 50 - \log_5 2}{\log_5 125}$
7. ସରଳାକୃତ ମାନ ସ୍ଥିର କର :
- $\frac{\log_2 8}{\log_2 16} = \text{---}$
  - $\frac{\log_2 32}{\log_2 4} = \text{---}$
  - $\frac{\log_3 \frac{1}{9}}{\log_3 \sqrt{3}} = \text{---}$
8. (i)  $x^2 + y^2 = 7xy$  ହେଲେ, ପ୍ରମାଣ କର ଯେ  $\log_a \frac{x+y}{3} = \frac{1}{2} (\log_a x + \log_a y)$   
( $a > 0, a \neq 1$ )
- (ii) ଯଦି  $\log_x \left( \frac{a+b}{2} \right) = \frac{1}{2} (\log_x a + \log_x b)$  ହୁଏ ତେବେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ,  $a = b$  |  
( $x > 0, x \neq 1$ )
9. ପ୍ରମାଣ କର ଯେ,  $\log_a (1+2+3) = \log_a 1 + \log_a 2 + \log_a 3$  ( $a > 0, a \neq 1$ )
10. (i)  $x, y, z$  ଓ  $a$  ଧନୀମୂଳ ବାନ୍ଧୁବ ସଂଖ୍ୟା ଓ  $a \neq 1$  ହେଲେ, ପ୍ରମାଣ କର ଯେ,  
 $x^{\log_a y - \log_a z} \times y^{\log_a z - \log_a x} \times z^{\log_a x - \log_a y} = 1$
- (ii) ଯଦି  $\frac{\log_a x}{y-z} = \frac{\log_a y}{z-x} = \frac{\log_a z}{x-y}$  ହୁଏ, ତେବେ ଦର୍ଶାଅ ଯେ,  $xyz = 1$  | ( $a \neq 1, b \neq 1$ )
11. ଦର୍ଶାଅ ଯେ,  $\log_a x \times \log_b y = \log_b x \times \log_a y$  ( $x, y, z$  ଓ  $a$  ଧନୀମୂଳ ବାନ୍ଧୁବ ସଂଖ୍ୟା ଓ  $a \neq 1$ )
12. ଦର୍ଶାଅ ଯେ,  $\log_{mn} x = \frac{\log_n x}{1 + \log_n m}$  ( $x, m, n \in R, m, n, 0, mn, 1$  ସହ ସମାନ ନୁହେଁ)
13. ସମାଧାନ କର :  $\frac{1}{\log_x 10} + 2 = \frac{2}{\log_5 10}$
14. ଯଦି  $\log_2 x + \log_4 x + \log_{16} x = \frac{21}{4}$  ହୁଏ, ତେବେ 'x' ର ମାନ ସ୍ଥିର କର |

### 3.10. ସାଧାରଣ ଲଗାରିଦମ୍ (Common Logarithm) :

$$a^x = y \Leftrightarrow \log_a y = x \quad (a > 0, a \neq 1, y > 0)$$

ଏଠାରେ 'a' ହେଉଛି ଲଗାରିଦମ୍ର ଆଧାର, ଯାହାର ମାନ 1 ରିନ୍ଦ ଯେ କୌଣସି ଧନାମୂଳକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା। ଯଦି 'y' ମାନ 10 ହୁଏ, ତେବେ ସେହି ଲଗାରିଦମକୁ ସାଧାରଣ ଲଗାରିଦମ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଲଗାରିଦମ୍ର ଆଧାର ଲେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ତେବେ ଆଧାର 10 ବୋଲି ବୁଝାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ  $\log 26$ ର ଆଧାର 10 ଥିଲା।

ନେପିଆରଙ୍କ ସମସାମ୍ୟକ ଜାଗରକ ଗଣିତୀୟ Henry Briggs (1561-1630), 1624 ମସିହାରେ 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲଗାରିଦମ୍ (Common Logarithm) ଉଭାବନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ନେପିଆର ଓ ବ୍ରିଗସ ମିଲିତଭାବେ ଲଗାରିଦମ୍ ସାରଣୀ (log table) ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନେପିଆରଙ୍କ ମୃଦ୍ୟପରେ ବ୍ରିଗସ ସେହି ସାରଣୀକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। 10 ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଲଗାରିଦମ୍ ସାରଣୀ “ସାଧାରଣ ଲଗ୍ ଟେବୁଲ୍” ନାମରେ ପରିଚିତ।

ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପକ୍ଷତି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲଗାରିଦମ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ଉପ୍ରୟୋଗିତା ଶୁଭ ଅଧିକ। ସାଧାରଣ ଲଗାରିଦମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲଗାରିଦମ୍ “ସ୍ଵାଭାବିକ ଲଗାରିଦମ୍” (Natural Logarithm) ବା ନେପିରୀୟ ଲଗାରିଦମ୍ (Napierian Logarithm)ର ପ୍ରଚଳନ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ। ସ୍ଵାଭାବିକ ଲଗାରିଦମ୍ର ଆଧାର ହେଉଛି, ଏକ ଅପରିମୋଯ ସଂଖ୍ୟା ‘e’ ଯାହାର ଦଶମିକ ବିଦ୍ୟୁପରେ ଦଶମ୍ବୂନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତମାନ ହେଉଛି 2.7182818284। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ  $\pi$  ଭଲି e ଗୋଟିଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଧନାମୂଳକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା y ର ସ୍ଵାଭାବିକ ଲଗାରିଦମକୁ ‘ $\ln x$ ’ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ  $\ln x$  ଅର୍ଥାତ୍,  $\log_a y = x$  ହେଲେ,  $y = e^x$ ।

କୌଣସି ଧନାମୂଳକ ସଂଖ୍ୟାର ଲଗାରିଦମୀୟ ମାନ ଏକ ଅପରିମୋଯ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ, ଦଶମିକ ବିଦ୍ୟୁପରେ କେବଳ ଚାରିଶ୍ଶାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତମାନ ଲଗ୍ ଟେବୁଲ୍ରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲଗାରିଦମୀୟମାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କେବଳ ଲଗାରିଦମୀୟ ନିଯମ ପ୍ରଯୋଗ କରି ଅନ୍ୟ କେତେବୁଡ଼ିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଲଗାରିଦମୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ ମଧ୍ୟ କରିଛେ।

ମନେରଖ : (ଆସନ୍ତମାନ)  $\log 2 = 0.3010$ ,  $\log 3 = 0.4771$ ,  $\log 7 = 0.8451$

ଉଦାହରଣ - 12 :

ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଲଗାରିଦମଗୁଡ଼ିକର ଆସନ୍ତମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

- (i)  $\log 4$       (ii)  $\log 5$       (iii)  $\log 6$       (iv)  $\log 21$       (v)  $\log 50$

ସମାଧାନ :

$$(i) \log 4 = \log 2^2 = 2 \log 2 = 2 \times 0.3010 = 0.6020 \quad (\text{ଉଚର})$$

$$(ii) \log 5 = \log \frac{10}{2} = \log 10 - \log 2 = 1 - 0.3010 = 0.6990 \quad (\text{ଉଚର})$$

(iii)  $\log 6 = \log (2 \times 3) = \log 2 + \log 3 = 0.3010 + 0.4771 = 0.7781$  (ଉଚ୍ଚର)

(iv)  $\log 21 = \log (3 \times 7) = \log 3 + \log 7 = 0.4771 + 0.8451 = 1.3222$  (ଉଚ୍ଚର)

(v)  $\log 50 = \log \frac{100}{2} = \log 100 - \log 2 = 2 - 0.3010 = 1.6990$  (ଉଚ୍ଚର)

ଉଦାହରଣ - 13 :

ନିମ୍ନପ୍ରଦର୍ଶ ଲଗାରିଦମଗୁଡ଼ିକର ଆସନ୍ତୁମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(i)  $\log \frac{1}{2}$       (ii)  $\log \frac{1}{3}$       (iii)  $\log (0.4)$       (iv)  $\log (0.0028)$

ସମାଧାନ :

(i)  $\log \frac{1}{2} = \log 1 - \log 2 = 0 - 0.3010 = -0.3010$  (ଉଚ୍ଚର)

(ii)  $\log \frac{1}{3} = \log 1 - \log 3 = 0 - 0.4771 = -0.4771$  (ଉଚ୍ଚର)

(iii)  $\log 0.4 = \log \frac{4}{10} = \log 4 - \log 10 = \log 2^2 - \log 10$   
 $= 2 \log 2 - \log 10 = (2 \times 0.3010) - 1 = 0.6020 - 1 = -0.3980$  (ଉଚ୍ଚର)

(iv)  $\log (0.0028) = \log \frac{28}{10^4} = \log 28 - \log 10^4$   
 $= \log (2^2 \times 7) - 4 \log 10 = 2 \log 2 + \log 7 - 4 \times 1$   
 $= 2 \times 0.3010 + 0.8451 - 4 = -2.5529$  (ଉଚ୍ଚର)

ମନୋରଖ : ଉଦାହରଣ-13କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଆମେ କାଣିପାରିବା ଯେ,

ଯଦି  $0 < y < 1$  ହୁଏ, ତେବେ  $\log y$ ର ମାନ ରଣାମୂଳକ ହେବ।

3.11 ଧନାମୂଳ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ଲଗାରିଦମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଲଗଟେବୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଯେ କୌଣସି ଧନାମୂଳ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ଲଗାରିଦମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛେବ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି  $10^n$  ( $n$  ଧନାମୂଳ ବା ରଣାମୂଳ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା) ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟିର ସାଧାରଣ ଲଗାରିଦମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଖୁବ୍ ସହଜ । କାରଣ

$$\log 10 = 1, \log 100 = \log 10^2 = 2, \log (10000) = \log 10^4 = 4,$$

$$\log 0.1 = \log (10^{-1}) = -1, \log (0.001) = \log 10^{-3} = -3 \text{ ଇତ୍ୟଦି।}$$

$$\text{ଅର୍ଥାତ୍, } \text{ସଂଖ୍ୟା } x = 10^n \text{ } (n \in \mathbb{Z}) \text{ ହେଲେ } \log x = n \text{ ହେବ।}$$

ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଧନାମୂଳ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ସାଧାରଣ ଲଗାରିଦମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମାନକରୂପ(standard form)ରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ।

ସଂଖ୍ୟା :

ଯଦି  $x$  ଏକ ଧନୀମୂଳକ ବାପ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, ତେବେ  $x$ ର ମାନକରୂପ ହେଉଛି,  $x = \alpha \times 10^n$   
ସେଇଠାରେ  $1 \leq \alpha < 10$  ଓ ଘାତାକ  $n$  ହେଉଛି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ।

ମାନକ ରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସାଧାରଣ ପରିଚି :

(1) ଧନୀମୂଳକ ବାପ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା  $x$  ର ଦଶମିକ ରୂପରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ଅବସ୍ଥାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏହାକି ଭାବରେ ବାମ ବା ଡାହାଣକୁ ଘୁଞ୍ଚାଅ ଯେପରି ବିନ୍ଦୁଟିର ପୁନଃସଂସ୍ଥାପନ ପରେ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଠାରୁ ବଡ଼ ବା 1 ସହିତ ସମାନ ହେବ; ମାତ୍ର 10 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ ନାହିଁ । ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ଏପରି ଘୁଞ୍ଚାଇ ଲେଖିବା ପରେ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି ମାନକ ରୂପ  $1 \alpha \times 10^n$  ରେ ‘ $\alpha$ ’ର ମୂଲ୍ୟ ।

(2)  $n$  ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଧନୀମୂଳକ ବାପ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା  $x$ , 1 ଠାରୁ ସାନ କିମ୍ବା ସାନ ନୁହେଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ।

(a) ଯଦି  $x < 1$  ହୁଏ, ତେବେ  $n = -(x$ ର ଦଶମିକ ପ୍ରକାଶରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା + 1)

(b) ଯଦି  $x > 1$  ହୁଏ, ତେବେ  $n = x$ ର ଦଶମିକ ପ୍ରକାଶରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କସଂଖ୍ୟା - 1  
ଉଦାହରଣ - 14 :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ମାନକରୂପ ଲେଖ ।

(i) 3.123 (ii) 40.7265 (iii) 312300 (iv) 0.003123 (v) 0.57123

ସମାଧାନ :

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| (i) $3.123 = 3.123 \times 10^0$        | $(\alpha = 3.123, n = 0)$   |
| (ii) $40.7265 = 4.07265 \times 10^1$   | $(\alpha = 4.07265, n = 1)$ |
| (iii) $312300 = 3.123 \times 10^5$     | $(\alpha = 3.123, n = 5)$   |
| (iv) $0.003123 = 3.123 \times 10^{-3}$ | $(\alpha = 3.123, n = -3)$  |
| (v) $0.57123 = 5.7123 \times 10^{-1}$  | $(\alpha = 5.7123, n = -1)$ |

ସୂଚନା : ଉଦାହରଣ 14ର ପ୍ରତ୍ୟେକର ପ୍ରଶ୍ନାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ  $\alpha$  ର ମୂଲ୍ୟ 1 ଠାରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାପ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ( $1 \leq \alpha < 10$ ) ଏବଂ  $n$  ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ।

3.12. ସାଧାରଣ ଲଗାରିଦମ୍ବ ଜ୍ୟାଗାକୁରିଷ୍ଟିକ୍ ଓ ମାଣ୍ଟିସା (Characteristic and Mantissa of a common logarithm) :

ମନୋକର  $x$  ଏକ ଧନୀମୂଳକ ବାପ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଓ ମାନକରୂପରେ  $x = \alpha \times 10^n$  ।

$$\therefore \log x = \log (\alpha \times 10^n) = \log \alpha + \log 10^n = \log \alpha + n \log 10 = n + \log \alpha$$

ସଂଖ୍ୟା :  $n$  ଓ  $\log \alpha$  କୁ ସଥାକୁମେ  $\log x$ ର କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍ ଓ ମାଣ୍ଡିସା କୁହାଯାଏ।

$$\begin{aligned}\text{ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ } \log (198.6) &= \log (1.986 \times 10^2) = \log 1.986 + \log 10^2 \\ &= 2 + \log 1.986\end{aligned}$$

$$\therefore \log 198.6 \text{ର କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍} = 2 \text{ ଓ ମାଣ୍ଡିସା} = \log 1.986$$

$$\text{ସେହିପରି } \log 20 \text{ର କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍ ହେଉଛି 1 ଓ ମାଣ୍ଡିସା ହେଉଛି } \log 2 = 0.30101$$

ମନେରଖ :

$\log x$ ର କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ବଦା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା (ଧନାମୂଳ ବା ରଣାମୂଳ); କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିସା  $\log \alpha$  ର ମୂଲ୍ୟ 0 କିମ୍ବା 0 ଓ 1 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା।

$$\text{କାରଣ } 1 \leq \alpha < 10 \Rightarrow \log 1 \leq \log \alpha < \log 10 \Rightarrow 0 \leq \log \alpha < 1$$

ମାନକରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସୂଚନାଯାଏ ଓ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି  $\log \alpha$  ର ମାନ ଲଗ ଟେବୁଲ ଦେଖୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ।

ମାଣ୍ଡିସାର ବିଶେଷ ଧର୍ମ : ଗୋଟିଏ ଧନାମୂଳ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶମିକ ପରିପ୍ରକାଶ (decimal expression) ରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ଓ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହୋଇ ଯଦି କେବଳ ଦଶମିକ ବିଦୂର ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଉପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଲଗାରିଦମଗୁଡ଼ିକର କେବଳ କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳେ, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିସା ଅପରିବର୍ତ୍ତି ରହେ ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର ।

ଉଦାହରଣ - 15 :

ନିମ୍ନ ଲଗାରିଦମଗୁଡ଼ିକର କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍ ଓ ମାଣ୍ଡିସା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

- (i)  $\log 198.6$  (ii)  $\log 19.86$  (iii)  $\log 0.1986$  (iv)  $\log 0.01986$

ସମାଧାନ :

$$(i) \log 198.6 = \log (1.986 \times 10^2) = 2 + \log 1.986$$

$$\therefore \text{କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍} = 2 \text{ ଓ ମାଣ୍ଡିସା} = \log 1.986$$

$$(ii) \log 19.86 = \log (1.986 \times 10^1) = 1 + \log 1.986$$

$$\therefore \text{କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍} = 1 \text{ ଓ ମାଣ୍ଡିସା} = \log 1.986$$

$$(iii) \log (0.1986) = \log (1.986 \times 10^{-1}) = -1 + \log 1.986$$

$$\therefore \text{କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍} = -1 \text{ ଓ ମାଣ୍ଡିସା} = \log 1.986$$

$$(iv) \log (0.01986) = \log (1.986 \times 10^{-2}) = -2 + \log 1.986$$

$$\therefore \text{କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍} = -2 \text{ ଓ ମାଣ୍ଡିସା} = \log 1.986 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍ ମାଣ୍ଡିସା ସମାନ ରହି କ୍ୟାରାକ୍ତୁରିଷ୍ଟିକ୍ ବଦଳିଯାଉଛି । ତେଣୁ କୌଣସି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା  $x$ ର ଲଗାରିଦମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ କେବଳ  $\log x$ ର ମାଣ୍ଡିସା  $\log \alpha$  ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଲଗଟେବୁଲର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ।

3.13. ଲଗ୍ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର : ମାନ୍ଦିଆର ମୂଳ୍ୟ ନିରୂପଣ ପାଇଁ ଲଗ୍ ସାରଣୀ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣର ସ୍ଵର୍ଗ ହେବ ।

## ଉଦ୍‌ବାହରଣ - 16 : ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

- (i)  $\log 250.7$       (ii)  $\log 2$       (iii)  $\log 0.005928$

ସମାଧାନ :

- $$(i) \text{ ମାନକରୂପରେ } 250.7 = 2.507 \times 10^2 \Rightarrow \log 250.7 = \log (2.507 \times 10^2) = 2 + \log 2.507$$

ମାଣ୍ଡିଷା log 2.507ର ମୂଳ୍ୟ କାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଗ୍ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା । ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲଗ୍ ସାରଣୀ ଦେଖା । ସାରଣୀର ବାମରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରେ 25 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖା । ଏହି ସଂଖ୍ୟା 25ର ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 3979, 3997, 4014 ଇତ୍ୟଦି । ଧାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିରେ ରହିଛି । ଏପରି ସମ୍ମାନ ଦଶଟି ପ୍ରତି ରହିଛି ଓ ପ୍ରତିରୁଡ଼ିକ ସାରଣୀର ଶାର୍ଷ ଭାଗରେ 0 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କ ଦାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ପ୍ରମାଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ଥଳ ନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଚାରିସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତମାନ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଏହି ଦଶଟି ପ୍ରମାଣ ଡାହାଣକୁ ଅଜ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଉ ନଅଗୋଟି ପ୍ରତି ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରତିରୁଡ଼ିକ ‘MEAN DIFFERENCES’ ବୋଲି ନାହିଁତ ହୋଇ ଶାର୍ଷ ଭାଗରେ 1 ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କଦାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥଳବିଶେଷରେ ଏକ ଅଙ୍କ ଓ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବାମପାର୍ଶ୍ଵକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶୁନ ବସାଇ ଆରମ୍ଭରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ଦେବାକ ହେବ ।

ଆମର ସଂଖ୍ୟା 2.507ରେ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର କ୍ରମ 2507 ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ତମ୍ଭର 25କୁ 0ବିକଲେ । 25ର ଡାହାଣକୁ .0 ଚିହ୍ନିତ ସ୍ତମ୍ଭ ସଂଖ୍ୟା 3979 ଅର୍ଥାତ୍ .3979ଥିବେ । ତତ୍ପରେ ସେହି ଧାଡ଼ିରେ (ଅର୍ଥାତ୍ .3979, 3997, 4014- ଏମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ିରେ) MEAN DIFFERENCES ର 7-ଚିହ୍ନିତ ସ୍ତମ୍ଭ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖ । ଏହା 12 ଅର୍ଥାତ୍ .0012 ଥିବେ । ଆମେ ପାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଦୟ ଅର୍ଥାତ୍ .3979 ଓ .0012ର ଲଗ୍ ସାରଣୀରେ ଅବସିଦ୍ଧ ନିମିଶରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଗଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ ସାରଣୀରୁ ପାଇଥିବା ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଆବଶ୍ୟକ ମାଣ୍ଣିସାର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମାଣ୍ଣିସା  $\log 2.507$  ମାନ ନିମ୍ନମତେ ନିରୂପିତ ହେଲା :

(i)  $\log 2.507 = .3979 + .0012 = .3991$  ବା  $0.3991$  ଏହା ହେଉଛି ଦଶମିକ ଚାରିସ୍ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  $\log 2.507$  ର ଆସନ୍ତୁମାନ। ତେଣୁ  $\log 250.7 = 2 + \log 2.507 = 2.3991$  (ଉଚ୍ଚର)

(ii)  $\log 2 = \log (2 \times 10^0) = 0 + \log 2$

( $2 = 2.0$  ନେଇ ସୂଚାନ୍ତ୍ୟାୟୀ ଦୂମେ କ୍ୟାରାକ୍ଷୁରିଷ୍ଟିକ୍ = 0 ଓ ମାଣ୍ଣିସା =  $\log 2$  ବା  $\log 2.0$  ଲେଖିପାର)

ଲଗ୍ ସାରଣୀରେ ଦୂମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣରେ 2 ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର  $2 = 2.00$  ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣରେ 20କୁ ଦେଖ। (ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରମାଣରେ 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ନଥାଏ) 20ର ତାହାର ପାଖକୁ 0 ଚିହ୍ନିତ ପ୍ରମାଣରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା 3010 ଅର୍ଥାତ୍  $.3010$  ଅଟେ। ଏଠାରେ MEAN DIFFERENCES ପ୍ରମାଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ।  $2.00$  ଅର୍ଥାତ୍  $2.0000$ ର ଦଶମିକ ବିଦ୍ୟୁପରେ ବୃତ୍ତାଯ ସ୍ଥାନରେ ଅଣଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କ ଥିଲେ ସେପରି କରିଥାଆଛେ। ତେଣୁ  $\log 2 = 0.3010$  (ଉଚ୍ଚର)

(iii)  $\log 0.005928 = \log (5.928 \times 10^{-3}) = -3 + \log 5.928$

=  $-3 + .7723 + .0006$  (ସାରଣୀ ଦେଖି ମୂଲ୍ୟ ବାହାରକର)

=  $-3 + 0.7729 = -2.2271$  ବା  $\bar{3}.7729$  (ଉଚ୍ଚର)

ସୂଚନା :

(1) ଦର ସଂଖ୍ୟା 1 ଠାରୁ ସାନ ହେଲେ କ୍ୟାରାକ୍ଷୁରିଷ୍ଟିକ୍ ରଣାମୂଳକ ହେବାରୁ ରଣାମୂଳକ ଲଗାରିଦମ୍ ମିଳେ।

$\log 0.005928 = -2.2271 = (-3 + 0.7729)$ , ଏପରି ଲେଖିଲେ କ୍ୟାରାକ୍ଷୁରିଷ୍ଟିକ୍ ଓ ମାଣ୍ଣିସା ସଂପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଉତ୍କଷଣାତ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ୟାରାକ୍ଷୁରିଷ୍ଟିକ୍ ଓ ମାଣ୍ଣିସାର ମାନ ସ୍ଵର୍ଗ ରୂପେ ସୂଚାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ସ୍ଥଳେ  $\log 0.005928 = \bar{3}.7729 -$  ଏପରି ଲେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ  $\bar{3}.7729$  ଅର୍ଥ  $-3 + 0.7729$  ଅଟେ। ମାତ୍ର  $\log 0.005928 = -2.2271$  ଲେଖିବା ଭୁଲ ନୁହେଁ।

(2) ବହିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲଗ୍ ସାରଣୀ ଚାରିଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ [  $\log 1.000$  ରୁ  $\log 9.999$  ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ] ମାଣ୍ଣିସା ଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଦଶମିକ ବିଦ୍ୟୁପରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ୍ତୁମାନ ନେଇ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ; କାରଣ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷ ନିୟମ (Principle of proportional parts) ଆଲୋଚନା ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ - 3(f)

ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

(i)  $\log 10000$

(ii)  $\log \sqrt{10}$

(iii)  $\log 0.0001$

(iv)  $\log \frac{1}{\sqrt{10}}$

(v)  $10^{\log 100}$

(vi)  $10^{2\log 5}$

2.  $\log 2 = 0.3010$ ,  $\log 3 = 0.4771$ ,  $\log 7 = 0.8451$ ,  $\log 11 = 1.0414$  এই মূল্যগুচ্ছকু  
ব্যবহার করি নিম্নরে দিআয়ারথৰা সংখ্যাগুচ্ছকৰ লগারিদমৰ আসন্নমান নির্ণয় কৰ।  
 (i) 20      (ii) 300      (iii) 7000      (iv)  $\frac{1}{20}$       (v)  $\frac{1}{3}$       (vi)  $\frac{1}{70}$   
 (vii) 0.0011      (viii) 0.6      (ix) 3.5      (x) 0.0084      (xi)  $3^{\frac{1}{10}}$       (xii) 77
3. নিম্নলিখিত সংখ্যাগুচ্ছকৰ মানকৰূপ লেখ এবং প্রত্যেক সংখ্যার লগারিদমৰ জ্যারাকুরিষ্টিক  
কেতে হেব লেখ।  
 (i) 76085      (ii) 3123      (iii) 0.577215      (iv) 0.00023      (v) 198.6  
 (vi) 1      (vii) 0.002902      (viii) 0.03010      (ix) 1428.57      (x) 294.2
4. বছনী মধ্যৰ ঘটিক উচ্চতা বাছ।  
 (i)  $\log 29.42$ ৰ জ্যারাকুরিষ্টিক কেতে? (-1, 1, -2, 2)  
 (ii)  $\log 0.001$ ৰ জ্যারাকুরিষ্টিক কেতে? (-3, 0, 1, 3)  
 (iii)  $\log 290200 - \log 0.002902$  কি প্রকাৰ সংখ্যা?  
 (শূন্য, দশমিক সংখ্যা, রশামূক পূর্ণসংখ্যা, ধনামূক পূর্ণসংখ্যা)  
 (iv)  $\log 2$ ৰ মান ব্যবহার কৰি কাহাৰ লগারিদম নির্ণয় কৰিহেব? (4.4, 22, 60, 0.032)  
 (v)  $\log 2$ ৰ মান 0.3010 হেলে  $\log 2000$ ৰ মান কেতে?  
 (3010, 301.0, 3.3010, -3.3010)
5. সারণী দেখু দৰ রাশিগুচ্ছকৰ সাধাৱণ লগারিদম নির্ণয় কৰ।  
 (i) 107, (ii) 401, (iii) 2.518, (iv) 0.3456, (v) 0.00005772
6. দৰ্শাও যে,  $\log_{10} 2$ ৰ মান  $\frac{3}{10}$  ও  $\frac{4}{13}$  মধ্যৰে রহিব।
7.  $\log_{1000} 2$ ৰ মান প্রিৰ কৰ যেতেবেলে  $\log_{10} 2$ ৰ মান 0.3010।
- 3.14. **আঞ্চলিগারিদম (Antilogarithm) :**
- মনেকৰ  $\log x = y$  ( $x > 0$  ও  $y \in \mathbb{R}$ ; লগারিদমৰ আধাৰ 10)। এহা গোটিএ লগারিদমায়  
সমাকৰণ (Logarithmic equation)। আমে  $x$  ও  $y$  মাধ্যমৰে প্ৰকাৰ কৰিবাকু যাই কহিবা  
 $x = \text{antilog } y$ . তেন্তে  $y = \log x \Rightarrow x = \text{antilog } y$  এবং  $x = \text{antilog } y \Rightarrow y = \log x$   
সংজ্ঞা :  $x = \text{antilog } y \Leftrightarrow y = \log x$
- অনুষ্ঠান - 1 :**
- (i)  $\log (\text{antilog } x) = x$ ;  $x \in \mathbb{R}$       (ii)  $\text{antilog} (\log x) = x$ ;  $x > 0$

ପ୍ରମାଣ : (i)  $\text{antilog } x = y$  (ମନେକର)

$$\Rightarrow \log y = x \text{ (ସଂଖ୍ୟା)} \Rightarrow \log (\text{antilog } x) = x \text{ (}\because \text{antilog } x = y\text{)} \text{ (ପ୍ରମାଣିତ)}$$

(ii)  $\log x = z$  (ମନେକର)

$$\Rightarrow \text{antilog } z = x \text{ (ସଂଖ୍ୟା)} \Rightarrow \text{antilog} (\log x) = x \text{ (}\because z = \log x\text{)} \text{ (ପ୍ରମାଣିତ)}$$

ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ - 2 :  $\text{antilog } x = 10^x$ ;  $x \in \mathbb{R}$

ପ୍ରମାଣ :  $\text{antilog } x = y$  (ମନେକର)

$$\Rightarrow \log y = x \text{ (ସଂଖ୍ୟା)} \Rightarrow y = 10^x \text{ (ସାଧାରଣ ଲଗାରିଦମ ସଂଖ୍ୟା)}$$

$$\Rightarrow \text{antilog } x = 10^x \text{ (}\because \text{antilog } x = y\text{)} \text{ (ପ୍ରମାଣିତ)}$$

ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ :

- (1) ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ - 1 ରୁ ଏହା ସୁଷ୍ଠୁ ଯେ ଲଗାରିଦମ ନିରୂପଣ ଓ ଆଣିଲଗାରିଦମ ନିରୂପଣ - ଏ ଉଚ୍ଚ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ ପ୍ରକ୍ରିୟା।
- (2)  $\log x$  ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ  $x > 0$  ହେବା ଦରକାର, ମାତ୍ର  $x$  ଯେ କୋଣସି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ  $\text{antilog } x$  ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଓ ଏହା ସର୍ବଦା ଧନାମୂଳ, କାରଣ  $\text{antilog } x = 10^x$  (ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2) ଓ  $10^x$  ( $x \in \mathbb{R}$ ) ସର୍ବଦା ଧନାମୂଳ)।

ଆଣିଲଗ ସାରଣୀର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାର ଆଣିଲଗାରିଦମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଧନାମୂଳ ସଂଖ୍ୟା  $x$  ମାନକରୂପରେ  $\alpha \times 10^n$  ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ,  $\log x = n + \log \alpha$  ଓ ମାଣିଷା  $\log \alpha$  କୁ ଲଗ ସାରଣୀରୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ବିପରୀତ କୁମେ କ୍ୟାରାକୁରିଷିକ୍  $n$  ଓ ମାଣିଷା  $\log \alpha$  ଜଣାଥିଲେ, ମାଣିଷାରୁ  $\alpha$  ର ମାନ ଆଣିଲଗ ସାରଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିରୂପିତ ହୁଏ; କାରଣ  $\text{antilog} (\log \alpha) = \alpha$ ।

ମନେକର  $\log x$  ର କ୍ୟାରାକୁରିଷିକ୍  $n$  ଓ ମାଣିଷା  $m$  ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି।  $x$  ର ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିବା।

$x = \alpha \times 10^n$  (ମାନକରୂପ) ହେଲେ  $\log x$ ର ମାଣିଷା  $\log \alpha$  ଅଟେ ତେଣୁ ଏ ଷେତ୍ରରେ  $m = \log \alpha$  ଅର୍ଥାତ୍  $\alpha = \text{antilog } m$

$$\therefore x = \alpha \times 10^n = 10^n \times \text{antilog } m \dots \dots \dots (1)$$

$$\log x = \text{କ୍ୟାରାକୁରିଷିକ୍} + \text{ମାଣିଷା} = n + m \quad (n \in \mathbb{Z}, 0 \leq m < 1)$$

$$\Rightarrow x = \text{antilog} (n + m) \dots \dots \dots (2)$$

(1) ଓ (2)ରୁ ଆମେ ପାଉ,

$$n \in \mathbb{Z} \text{ ଓ } 0 \leq m < 1 \text{ ହେଲେ } \text{antilog} (n + m) = 10^n \times \text{antilog } m$$

$0 \leq m < 1$  ପାଇଁ ଆଣିଲଗ ସାରଣୀରୁ  $\text{antilog } m$ ର ମାନ ନିରୂପଣ କରି ଉପରୋକ୍ତ ସୂତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ  $\text{antilog} (n + m)$  ଅର୍ଥାତ୍  $x$  ନିରୂପିତ ହୁଏ।

$\text{antilog } m = \alpha \cdot 1 \leq \alpha < 10$  ହେଉଥିବାରୁ antilog mର ଦଶମିକ ପ୍ରକାଶରେ ଦଶମିକ ବିଦୁ ବାମକୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଣଶୂନ୍ୟ ଅଙ୍କ (non zero digit) ରହିବ ।

ଆଣିଲଗ୍ ସାରଣୀରୁ antilog mର ଆସନ୍ତମାନର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ହିଁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼େ । ସେଥିରେ ଦଶମିକ ବିଦୁକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହୁଏ, ଯେପରି  $1 \leq \text{antilog } m < 10$  ହେବ ।

### 3.15. ଆଣିଲଗ୍ ସାରଣୀର ବ୍ୟବହାର :

ଉଦାହରଣ - 17 :

ଆଣିଲଗ୍ ସାରଣୀ ଦେଖି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(i)  $\text{antilog } 0.4771$  (ii)  $\text{antilog } 1.0792$  (iii)  $\text{antilog } \bar{3}.6412$  (iv)  $\text{antilog } (-2.4801)$

ସମାଧାନ :

(i) ଆଣିଲଗ୍ ସାରଣୀର ବାମରୁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟମରେ .47କୁ ଦେଖ । ଏହାର ଡାହାଣ ପାଖକୁ 7 ଚିହ୍ନିତ ଷ୍ଟମରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା 2999 ଅଟେ । ଡାହାପରେ ସେ ଧାଡ଼ିରେ ଡାହାଣକୁ MEAN DIFFERENCES ଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ । ଚିହ୍ନିତ ଷ୍ଟମରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ସେଠାରେ । ଥିବାର ସାରଣୀରୁ ଦେଖିବ । ପାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା 2999 ଓ 1 ଯୋଗକଲେ ଆମେ ପାଇବା  $2999 + 1 = 3000$  ଓ ଏଥିରେ ଦଶମିକ ବିଦୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ antilog 0.4771ର ମାନ ପାଇବା ।  $1 \leq \text{antilog } m < 10$  ହେଉଥିବାରୁ ଆମକୁ 3ର ଡାହାଣକୁ ଦଶମିକ ବିଦୁ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେଣୁ  $\text{antilog } 0.4771 = 3$  3.000 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଅଟେ ।  $\therefore \text{antilog } 0.4771 = 3$  (ଉଚର)

(ii)  $1.0792 = n + m = 1 + 0.0792$  (କ୍ୟାରାକ୍ରିଟିକ,  $n = 1$  ଓ ମାଣିଷା  $m = 0.0792$ )

ତେଣୁ ସୁତ୍ର ଅନୁୟାୟୀ  $\text{antilog } 1.0792 = \text{antilog } (1 + 0.0792) = 10^1 \times \text{antilog } 0.0792$  ଅର୍ଥାତ୍,  $\text{antilog } 0.0792$  ସାରଣୀ ଦେଖି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ( $0.0792$ ରେ ଦଶମିକ ବିଦୁର ବାମକୁ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଆମକୁ .0792 ପାଇଁ ସାରଣୀ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ।) antilog ସାରଣୀରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟମରେ ଥିବା .07ର ଡାହାଣକୁ ସେହି ଧାଡ଼ିରେ 9 ଚିହ୍ନିତ ଷ୍ଟମରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା = 1199 ଓ ସେହି ଧାଡ଼ିରେ MEAN DEFERENCES ର 2 ଚିହ୍ନିତ ଷ୍ଟମରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା 1 ଅଟେ ।  $1199 + 1 = 1200$  ଏବଂ ଦଶମିକ ବିଦୁ ବସାଇ ଆମେ ପାଇବା  $\text{antilog } 0.0792 = 1.2$

ତେଣୁ  $\text{antilog } 1.0792 = 10^1 \times \text{antilog } 0.0792 = 10 \times 1.2 = 12$  (ଉଚର)

(iii)  $\text{antilog } \bar{3}.6412 = \text{antilog } (-3 + 0.6412)$

$= 10^{-3} \times \text{antilog } 0.6412 = 10^{-3} \times 4.377 = 0.004377$  (ଉଚର)

(ସାରଣୀ ଦେଖି 0.6412 ର antilog ସ୍ଥିର କର)

(iv)  $-2.4801 = -(2 + 0.4801) = -2 - 0.4801$

ଆଣିଲଗ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ  $-2.4801$ କୁ  $n + m$  ( $n \in Z, 0 \leq m < 1$ ) ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ; କାରଣ  $-0.4801$  ଗୋଟିଏ ମାଣିଷା ନୁହେଁ । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦଶମିକ ଅଙ୍କକୁ ଧନୀମଳ ରାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

$$\text{ସୁତରାଂ}, -2.4801 = -2 - 1 + 1 - 0.4801 = -3 + 0.5199 = \bar{3}.5199$$

$$\text{ତେଣୁ antilog } (-2.4801) = \text{antilog } (-3 + 0.5199)$$

$$= 10^{-3} \times \text{antilog } 0.5199 = 10^{-3} \times 3.311 = 0.003311 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

### ଅନୁଶୀଳନୀ - 3(g)

1. ମୂଲ୍ୟ କେତେ ?  
 (i) antilog 2                  (ii) antilog (log 3)                  (iii) log (antilog 5)
2. ଯେଉଁଟି ସମ୍ବନ୍ଧ, ତା ପାଇଁ ‘T’, ଯେଉଁଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧ, ତା ପାଇଁ ‘F’ ଲେଖ।  
 (i)  $\log x < 0; 0 < x < 1$                   (ii)  $\log x = 0, x > 0$   
 (iii)  $\text{antilog } x < 0, x \in \mathbb{R}$                   (iv)  $\text{antilog } x = 0, x \in \mathbb{R}$
3.  $n + m$  ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କର, ଯେଉଁଠାରେ  $n \in \mathbb{Z}$  ଏବଂ  $0 \leq m < 1$ ।  
 (i)  $-2.7361$                   (ii)  $-0.621$                   (iii)  $6.732$                   (iv)  $-3.4061$                   (v)  $\bar{2}.6257$
4.  $\text{antilog } 0.6445 = 4.411$  ହେଲେ, ନିମ୍ନେ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଲଗାରିଦମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।  
 (i)  $1.6445$                   (ii)  $\bar{2}.6445$                   (iii)  $-2.3555$
5. ଯଦି  $\text{antilog } (\bar{2}.3997) = 0.0251$  ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଲଗାରିଦମ୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।  
 (i)  $\bar{4}.3997$                   (ii)  $0.3997$                   (iii)  $2.3997$                   (iv)  $\bar{1}.3997$
6. ଆଣ୍ଟିଲଗ ସାରଣୀ ଦେଖି ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।  
 (i)  $\text{antilog } 0.3825$                   (ii)  $\text{antilog } 1.8983$   
 (iii)  $\text{antilog } \bar{2}.6045$                   (iv)  $\text{antilog } (-1.3955)$
7. ନିମ୍ନରେ କେତେକ ସଂଖ୍ୟାର ଲଗାରିଦମ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିର କର।  
 (i)  $2.415$                   (ii)  $\bar{1}.1598$                   (iii)  $0.6446$                   (iv)  $3.9525$                   (v)  $1.0073$

#### 3.16. ଲଗାରିଦମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ (Applications of Logarithm) :

ଲଗାରିଦମ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଲଗାରିଦମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶୁଣନ, ହରଣ, ଘାତ ନିର୍ବ୍ୟବଣ ତଥା ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ସହଜରେ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମୂଳସୂଧ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବ, ଘାତାଙ୍କୀୟ ସମାକରଣର ସମାଧାନ ଉତ୍ସାହି ଲଗାରିଦମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହିସବୁ ହିସାବରେ ଉତ୍ତରଣ ସଠିକ୍ ନହୋଇ ଆସନ୍ତମାନ ହୋଇଯାଏ ।

[ସୂଚନା : ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ  $\log 2, \log 3, \log 7, \log 10 \dots$  ଉତ୍ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ।]

ଉଦ୍ଧାରଣ - 18 :

4<sup>୧୯</sup> ସଂଖ୍ୟାଟିରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ :

$$\log 4^{15} = 15 \log 4 = 15 \log 2^2 = 30 \log 2 = 30 \times 0.3010 = 9.03$$

ଯେହେତୁ  $\log 4^{15}$  ର କ୍ୟାଗାକୁଣ୍ଡିକ 9, ତେଣୁ ଦର ସଂଖ୍ୟାଟିରେ  $9 + 1 = 10$  ଅଳ୍ପ ଅଛି ।  
(ଉଚ୍ଚର)

ଉଦାହରଣ - 19 : ସମାଧାନ କର  $2^x = 3$

ସମାଧାନ :

$$2^x = 3 \Rightarrow \log 2^x = \log 3 \Rightarrow x \log 2 = \log 3 \Rightarrow x = \frac{\log 3}{\log 2} \dots \dots \dots \text{(i)}$$

$$\therefore x = \frac{0.4771}{0.3010} = 1.585 \text{ (ଆସନ୍ନମାନ)} \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ବିକଳ୍ପ ସମାଧାନ : (i)ରୁ ପାଇବା  $\log x = \log 4.771 - \log 3.010 = 0.6786 - 0.4786 = 0.2000$

$$\therefore x = \text{antilog } (0.2000) = 1.583 \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଉଦାହରଣ - 20 :

$$\text{ସମାଧାନ କର } 5^{5-3x} = 2^{x+3}$$

ସମାଧାନ :

$$\begin{aligned} 5^{5-3x} = 2^{x+3} &\Rightarrow \log 5^{5-3x} = \log 2^{x+3} \\ &\Rightarrow (5-3x) \log 5 = (x+3) \log 2 \Rightarrow (5-3x) \log \frac{10}{2} = (x+3) \log 2 \\ &\Rightarrow (5-3x)[1-\log 2] = (x+3) \log 2 \Rightarrow 5-3x = (5-3x+x+3) \log 2 \\ &\Rightarrow 5-3x = (8-2x) \log 2 \Rightarrow x(3-2 \log 2) = 5-8 \log 2 \\ &\Rightarrow x = \frac{5-8 \log 2}{3-2 \log 2} = \frac{5-8 \times 0.3010}{3-2 \times 0.3010} = \frac{5-2.4080}{3-0.6020} = \frac{2.5920}{2.3980} \dots \dots \text{(i)} \\ &= 1.081 \text{ (ଆସନ୍ନମାନ)} \quad (\text{ଉଚ୍ଚର}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ବ.ଦ୍ର. : (i) ର ଉଚ୍ଚୟ ପାର୍ଶ୍ଵର ଲଗାରିଦମ୍ ନେବେ ପାଇବା } \log x &= \log 2.592 - \log 2.398 \\ &= 0.4136 - 0.3799 = 0.0337 \end{aligned}$$

$$\therefore x = \text{antilog } (.0337) = 1.081 \text{ (ଆସନ୍ନମାନ)} \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

ଉଦାହରଣ - 21 :

ବାର୍ଷିକ 5% ହାର ସୁଧରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଏକ ମୂଳଧନର ସମ୍ମଳସୁଧ ଦିଗୁଣିତ ହେବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ସମାଧାନ :

ମନେକର ମୂଳଧନ = P ଟଙ୍କା, ସୁଧର ହାର = r% ଟଙ୍କା, ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା = n ତେବେ

$$\text{ସମ୍ମଳ ସୁଧ } M = P \left( 1 + \frac{r}{100} \right)^n$$

$$\text{ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ } 2P = P \left( 1 + \frac{5}{100} \right)^n \Rightarrow 2 = \left( \frac{21}{20} \right)^n \Rightarrow n \log \frac{21}{20} = \log 2$$

$$\Rightarrow n = \frac{\log 2}{\log 21 - \log 20} = \frac{\log 2}{\log(3 \times 7) - \log(2 \times 10)} = \frac{\log 2}{\log 3 + \log 7 - \log 2 - \log 10}$$

$$= \frac{0.3010}{0.4771 + 0.8450 - 0.3010 - 1} = 14.2 \text{ (ଆସନ୍ନମାନ)}$$

∴ ଦତ୍ତ ମୂଳଧରଣ ସମୂଳ ସୁଧ 14.2 ବର୍ଷରେ ଦିଗ୍ନିତ ହେବ। (ଉଚର)

ସୂଚନା :

ଯଦି ଛଥମାସରେ ଥରେ ସୁଧ ହିସାବ ହେଉଥାଏ, ତେବେ  $n = \frac{1}{2}$  ହେବ।

ବିଶେଷ ସୂଚନା :

ସମୂଳ ସୁଧ ସୂଚକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜନସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ।

ସୂଚକ : ଜନସଂଖ୍ୟା = P, ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିହାର = r% ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା = n ହେଲେ,

$$n \text{ ବର୍ଷପରେ ଜନସଂଖ୍ୟା} = P \left(1 + \frac{r}{100}\right)^n$$

ଉଦାହରଣ - 22 :

ଆସନ୍ନମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର : (i)  $\sqrt[7]{100}$  (ii)  $10^{2.3}$

ସମାଧାନ :

$$(i) \log(100)^{\frac{1}{7}} = \log(10)^{\frac{2}{7}} = \frac{2}{7} \log 10 = 0.2857$$

$$\therefore \sqrt[7]{100} = \text{antilog}(0.2857) = 1.931 \quad (\text{ଉଚର})$$

$$(ii) \log 10^{2.3} = 2.3 \log 10 = 2.3$$

$$\therefore 10^{2.3} = \text{antilog}(2.3) = \text{antilog}(2 + 0.300)$$

$$= 10^2 \times \text{antilog } 0.300 = 10^2 \times 1.995 = 199.5 \quad (\text{ଉଚର})$$

ଉଦାହରଣ - 23 :

$$\frac{(15.75)^{\frac{1}{3}} \times 0.1562}{5.367} \text{ ର ଆସନ୍ନମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।}$$

$$\text{ସମାଧାନ : } \log \frac{(15.75)^{\frac{1}{3}} \times 0.1562}{5.367} = \log \left\{ (15.75)^{\frac{1}{3}} \times 0.1562 \right\} - \log 5.367$$

$$= \log (1.575)^{\frac{1}{3}} + \log (0.1562) - \log 5.367$$

$$= \frac{1}{3} \log(15.75 \times 10) + \log (1.562 \times 10^{-1}) - \log 5.367$$

$$= \frac{1}{3} \log (1.575 + 1) + \log 1.562 - 1 - \log 5.367$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{3}(0.1973 + 1) + 0.1937 - 1 - 0.7298 = (0.3991 + 0.1937) - (1 + 0.7298) \\
 &= 0.5928 - 1.7298 = -1.1370 = -2 + 0.8630 = \bar{2}.8630 \\
 \therefore \frac{(15.75)^{\frac{1}{3}} \times 0.1562}{5.367} &= \text{antilog } (\bar{2}.8630) = \text{antilog } (-2 + 0.8630) \\
 &= 10^{-2} \times \text{antilog } 0.8630 = 10^{-2} \times 7.295 = 0.0729
 \end{aligned} \quad (\text{ଉଚ୍ଚର})$$

### ଅନୁଶୀଳନୀ - 3(h)

1.  $2^7, 3^{11}$  ଓ  $7^5$  ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକରେ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ଅଙ୍କ ଅଛି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।
2. ଲଗାରିଦମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାଧାନ କର।  
 (i)  $3^x = 5$ , (ii)  $3^x = 4$ , (iii)  $2^x \cdot 3^{2x} = 100$ , (iv)  $6^{3-4x} \cdot 4^{x+5} = 8$ , (v)  $2^{x-3} = 5^{x-3}$
3. ବାର୍ଷିକ 4% ହାର ସୁଧରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଏକ ମୂଳଧନର ସମୂଳସୁଧ ଦିଗ୍ରାଣିତ ହେବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।
4. ବାର୍ଷିକ 5% ହାର ସୁଧରେ କେତେ ବର୍ଷରେ ଏକ ମୂଳଧନର ସମୂଳସୁଧ ତ୍ରିଗ୍ରାଣିତ ହେବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।
5. 2001 ମସିହାରେ ଏକ ନଗରୀର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା  $6.7 \times 10^6$ । ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃକ୍ଷିହାର ବାର୍ଷିକ 2.5% ହୁଏ, ତେବେ 2011 ମସିହାରେ ନଗରୀଟିର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।
6. ଲଗ ସାରଣୀ ଓ ଆର୍ଣ୍ଣିଲଗ ସାରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସନ୍ନମାନ ସ୍ଥିର କର।  
 (i)  $(0.724)^3$       (ii)  $\sqrt{1.52}$       (iii)  $(100)^{\frac{1}{3}}$       (iv)  $\frac{17.36 \times 5.002}{4.21}$   
 (v)  $\frac{0.678 \times 9.01}{0.0234}$       (vi)  $\sqrt[3]{\frac{1}{4.12}}$       (vii)  $\frac{\sqrt{0.00271} \times \sqrt[3]{41.8}}{0.612}$
7. 1.568 ସେ.ମି. ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର କର।  $\left( \pi = \frac{22}{7} \right)$
8. ଗୋଟିଏ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁର ଦେର୍ଘ୍ୟ 10 ସେ.ମି. ହେଲେ, ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସ୍ଥିର କର।



## LOGARITHMS

 $\log_{10} N$ 

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ADD NUM BERS IN MEAN DIF FER ENCE COL UMNS	MEAN DIFFERENCES								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374		5	9	13	17	21	26	30	34	38
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755		4	8	12	16	20	24	28	32	36
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106		4	8	12	16	20	23	27	31	35
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430		4	7	11	15	18	22	26	29	33
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732		3	7	11	14	18	21	25	28	32
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014		3	7	10	14	17	20	24	27	31
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279		3	6	10	13	16	19	23	26	29
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529		3	7	10	13	16	19	22	25	29
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765		3	6	9	12	14	17	20	23	26
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989		3	6	9	11	14	17	20	23	26
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201		3	5	8	10	13	16	18	21	23
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404		3	5	8	10	13	15	18	20	23
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598		2	4	6	8	10	12	14	16	18
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784		2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962		2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133		2	3	5	7	9	10	12	14	15
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298		2	3	5	7	8	10	11	13	15
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456		2	3	5	6	8	9	11	13	14
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609		2	3	5	6	8	9	11	12	14
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757		1	3	4	6	7	9	10	12	13
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900		1	3	4	6	7	9	10	11	13
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038		1	3	4	6	7	8	10	11	12
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172		1	3	4	5	7	8	9	11	12
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302		1	3	4	5	6	8	9	10	12
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428		1	3	4	5	6	8	9	10	11
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551		1	2	4	5	6	7	9	10	11
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670		1	2	4	5	6	7	8	10	11
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786		1	2	3	5	6	7	8	9	10
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899		1	2	3	5	6	7	8	9	10
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010		1	2	3	4	5	7	8	9	10
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117		1	2	3	4	5	6	8	9	10
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222		1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325		1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425		1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522		1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618		1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	6628	6637	6646	6655	6665	6675	6684	6693	6702	6712		1	2	3	4	5	6	7	7	8
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803		1	2	3	4	5	5	6	7	8
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893		1	2	3	4	4	5	6	7	8
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981		1	2	3	4	4	5	6	7	8

MEAN DIFFERENCES

## LOGARITHMS

 $\log_{10} N$ 

N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ADD NUMBERS IN MEAN DIFFERENCE COLUMNS	MEAN DIFFERENCES								
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067		1	2	3	3	4	5	6	7	8
51	7066	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7235	7143	7152		1	2	3	3	4	5	6	7	8
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235		1	2	2	3	4	5	6	7	7
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316		1	2	2	3	4	5	6	6	7
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396		1	2	2	3	4	5	6	6	7
55	7404	7412	7419	7427	7435	7443	7451	7459	7466	7474		1	2	2	3	4	5	5	6	7
56	7482	7490	7497	7505	7513	7520	7528	7536	7543	7551		1	2	2	3	4	5	5	6	7
57	7559	7566	7574	7582	7589	7597	7604	7612	7619	7627		1	2	2	3	4	5	5	6	7
58	7634	7642	7649	7657	7664	7672	7679	7686	7694	7701		1	1	2	3	4	4	5	5	6
59	7709	7716	7723	7731	7738	7745	7752	7760	7767	7774		1	1	2	3	4	4	5	6	7
60	7782	7789	7796	7803	7810	7818	7825	7832	7839	7846		1	1	2	3	4	4	5	6	6
61	7853	7860	7868	7875	7882	7889	7896	7903	7910	7917		1	1	2	3	4	4	5	6	6
62	7924	7931	7938	7945	7952	7959	7966	7973	7980	7987		1	1	2	3	3	4	5	6	6
63	7993	8000	8007	8014	8021	8028	8035	8041	8048	8055		1	1	2	3	3	4	5	5	6
64	8062	8069	8075	8082	8089	8096	8102	8109	8116	8122		1	1	2	3	3	4	5	5	6
65	8129	8136	8142	8149	8156	8162	8169	8176	8182	8189		1	1	2	3	3	4	5	5	6
66	8195	8202	8209	8215	8222	8228	8235	8241	8248	8254		1	1	2	3	3	4	5	5	6
67	8261	8267	8274	8280	8287	8293	8299	8306	8312	8319		1	1	2	3	3	4	5	5	6
68	8325	8331	8338	8344	8351	8357	8363	8370	8376	8382		1	1	2	3	3	4	4	5	6
69	8388	8395	8401	8407	8414	8420	8426	8432	8439	8445		1	1	2	2	3	4	4	5	6
70	8451	8457	8463	8470	8476	8482	8288	8494	8500	8506		1	1	2	2	3	4	4	5	6
71	8513	8519	8525	8531	8537	8543	8549	8555	8561	8567		1	1	2	2	3	4	4	5	5
72	8573	8579	8585	8591	8597	8603	8609	8615	8621	8627		1	1	2	2	3	4	4	5	5
73	8633	8639	8645	8651	8657	8663	8669	8675	8681	8686		1	1	2	2	3	4	4	5	5
74	8692	8698	8704	8710	8716	8722	8727	8733	8739	8745		1	1	2	2	3	4	4	5	5
75	8751	8756	8762	8768	8774	8779	8785	8791	8797	8802		1	1	2	2	3	3	4	5	5
76	8808	8814	8820	8825	8831	8837	8842	8848	8854	8859		1	1	2	2	3	3	4	5	5
77	8865	8871	8876	8882	8887	8893	8899	8904	8910	8915		1	1	2	2	3	3	4	4	5
78	8921	8927	8932	8938	8943	8949	8954	8960	8965	8971		1	1	2	2	3	3	4	4	5
79	8976	8982	8987	8993	8998	9004	9009	9015	9020	8925		1	1	2	2	3	3	4	4	5
80	9031	9036	9042	9047	9053	9058	9063	9069	9074	9079		1	1	2	2	3	3	4	4	5
81	9085	9090	9096	9101	9106	9112	9117	9122	9128	9133		1	1	2	2	3	3	4	4	5
82	9138	9143	9149	9154	9159	9165	9170	9175	9180	9186		1	1	2	2	3	3	4	4	5
83	9191	9196	9201	9206	9212	9217	9222	9227	9232	9238		1	1	2	2	3	3	4	4	5
84	9243	9248	9253	9258	9263	9269	9274	9279	9284	9289		1	1	2	2	3	3	4	4	5
85	9294	9299	9304	9309	9315	9320	9325	9330	9335	9340		1	1	2	2	3	3	4	4	5
86	9345	9350	9355	9360	9365	9370	9375	9380	9385	9390		1	1	2	2	3	3	4	4	5
87	9395	9400	9405	9410	9415	9420	9425	9430	9435	9440		0	1	1	2	2	3	3	4	4
88	9445	9450	9455	9460	9465	9469	9474	9479	9484	9489		0	1	1	2	2	3	3	4	4
89	9494	9499	9504	9509	9513	9518	9523	9528	9533	9538		0	1	1	2	2	3	3	4	4
90	9542	9547	9552	9557	9562	9566	9571	9576	9581	9586		0	1	1	2	2	3	3	4	4
91	9590	9595	9600	9605	9609	9614	9619	9624	9628	9633		0	1	1	2	2	3	3	4	4
92	9638	9643	9647	9652	9657	9661	9666	9671	9675	9680		0	1	1	2	2	3	3	4	4
93	9685	9689	9694	9699	9703	9708	9713	9717	9722	9727		0	1	1	2	2	3	3	4	4
94	9731	9736	9741	9745	9750	9754	9759	9763	9768	9773		0	1	1	2	2	3	3	4	4
95	9777	9782	9786	9791	9795	9800	9805	9809	9814	9818		0	1	1	2	2	3	3	4	4
96	9823	9827	9832	9836	9841	9845	9850	9854	9859	9863		0	1	1	2	2	3	3	4	4
97	9868	9872	9877	9881	9886	9890	9894	9899	9903	9908		0	1	1	2	2	3	3	4	4
98	9912	9917	9921	9926	9930	9934	9939	9943	9948	9952		0	1	1	2	2	3	3	4	4
99	9956	9961	9965	9969	9974	9978	9983	9987	9991	9996		0	1	1	2	2	3	3	4	4

MEAN DIFFERENCES

## ANTI-LOGARITHMS

10<sup>x</sup>

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	MEAN DIFFERENCES									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
.00	1000	1002	1005	1007	1009	1012	1014	1016	1019	1021	A	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.01	1023	1026	1028	1030	1033	1035	1038	1040	1042	1045	D	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.02	1047	1050	1052	1054	1057	1059	1062	1064	1067	1069	N	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.03	1072	1074	1076	1079	1081	1084	1086	1089	1091	1094	B	0	0	1	1	1	1	2	2	2
.04	1096	1099	1102	1104	1107	1109	1112	1114	1117	1119	U	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.05	1122	1125	1127	1130	1132	1135	1138	1140	1143	1146	M	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.06	1148	1151	1153	1156	1159	1161	1164	1167	1169	1172	I	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.07	1175	1178	1180	1183	1186	1189	1191	1194	1197	1199	N	0	1	1	1	1	2	2	2	2
.08	1202	1205	1208	1211	1213	1216	1219	1222	1225	1227	S	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.09	1230	1233	1236	1239	1242	1245	1247	1250	1253	1256	O	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.10	1259	1262	1265	1268	1271	1274	1276	1279	1282	1285	R	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.11	1288	1291	1294	1297	1300	1303	1306	1309	1312	1315	P	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.12	1318	1321	1324	1327	1330	1334	1337	1340	1343	1346	V	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.13	1349	1352	1355	1358	1361	1365	1368	1371	1374	1377	W	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.14	1380	1384	1387	1390	1393	1396	1400	1403	1406	1409	X	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.15	1413	1416	1419	1422	1426	1429	1432	1435	1439	1442	Z	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.16	1445	1449	1452	1455	1459	1462	1466	1469	1472	1476	C	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.17	1479	1483	1486	1489	1493	1496	1500	1503	1507	1510	E	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.18	1514	1517	1521	1524	1528	1531	1535	1538	1542	1545	G	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.19	1549	1552	1556	1560	1563	1567	1570	1574	1578	1581	H	0	1	1	1	1	2	2	2	3
.20	1585	1589	1592	1596	1600	1603	1607	1611	1614	1618	M	0	1	1	1	1	2	2	3	3
.21	1622	1626	1629	1633	1637	1641	1644	1648	1652	1656	I	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.22	1660	1663	1667	1671	1675	1679	1683	1687	1690	1694	N	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.23	1698	1702	1706	1710	1714	1718	1722	1726	1730	1734	S	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.24	1738	1742	1746	1750	1754	1758	1762	1766	1770	1774	O	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.25	1778	1782	1786	1791	1795	1799	1803	1807	1811	1816	Z	0	1	1	1	2	2	2	3	3
.26	1820	1824	1828	1832	1837	1841	1845	1849	1854	1858	C	0	1	1	1	2	2	3	3	4
.27	1862	1866	1871	1875	1879	1884	1888	1892	1897	1901	E	0	1	1	1	2	2	3	3	4
.28	1905	1910	1914	1919	1923	1928	1932	1936	1941	1945	G	0	1	1	1	2	2	3	3	4
.29	1950	1954	1959	1963	1968	1972	1977	1982	1986	1991	H	0	1	1	1	2	2	3	3	4
.30	1995	2000	2004	2009	2014	2018	2023	2028	2032	2037	M	0	1	1	1	2	2	3	3	4
.31	2042	2046	2051	2056	2061	2065	2070	2075	2080	2084	I	0	1	1	1	2	2	3	3	4
.32	2089	2094	2099	2104	2109	2113	2118	2123	2128	2133	N	0	1	1	1	2	2	3	3	4
.33	2138	2143	2148	2153	2158	2162	2168	2173	2178	2183	S	0	1	1	1	2	2	3	3	4
.34	2188	2193	2198	2203	2208	2213	2218	2223	2228	2234	O	1	1	2	2	3	3	3	4	5
.35	2239	2244	2249	2254	2259	2265	2270	2275	2280	2286	Z	1	1	2	2	3	3	3	4	5
.36	2291	2296	2301	2307	2312	2317	2323	2328	2333	2339	C	1	1	2	2	3	3	3	4	5
.37	2344	2350	2355	2360	2366	2371	2377	2382	2388	2393	E	1	1	2	2	3	3	3	4	5
.38	2399	2404	2410	2415	2421	2427	2432	2438	2443	2449	G	1	1	2	2	3	3	3	4	5
.39	2455	2460	2466	2472	2477	2483	2489	2495	2500	2506	H	1	1	2	2	3	3	3	4	5
.40	2512	2518	2523	2529	2535	2541	2547	2553	2559	2564	M	1	1	2	2	3	4	4	5	5
.41	2570	2576	2582	2588	2594	2600	2606	2612	2618	2624	I	1	1	2	2	3	4	4	5	5
.42	2630	2636	2642	2649	2655	2661	2667	2673	2679	2685	N	1	1	2	2	3	4	4	5	6
.43	2692	2698	2704	2710	2716	2723	2729	2735	2742	2748	S	1	1	2	3	3	4	4	5	6
.44	2754	2761	2767	2773	2780	2786	2793	2799	2805	2812	O	1	1	2	3	3	4	4	5	6
.45	2818	2825	2831	2838	2844	2851	2858	2864	2871	2877	Z	1	1	2	3	3	4	5	5	6
.46	2884	2891	2897	2904	2911	2917	2924	2931	2938	2944	C	1	1	2	3	3	4	5	5	6
.47	2951	2958	2965	2972	2979	2985	2992	2999	3006	3013	E	1	1	2	3	3	4	5	5	6
.48	3020	3027	3034	3041	3048	3055	3062	3069	3076	3083	G	1	1	2	3	4	4	5	6	6
.49	3090	3097	3105	3112	3119	3126	3133	3141	3148	3155	H	1	1	2	3	4	4	5	6	6

## ANTI-LOGARITHMS

10\*